增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論 二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



增廣太平惠民和劑局方

附用藥總論

(二)

陳師文等編

增廣太平惠民和劑局方卷四

痰飲　附咳嗽

【倍朮圓】治五飲酒癖。一曰留飲。停水在心下。二曰癖飲。水癖在兩脇下。三曰痰飲。水在胃下。四曰溢飲。水溢在膈上五臟間。五曰流飲。水在腸間。動搖有聲。皆由飲酒冒寒。或飲水過多所致。並宜治之。

白朮一斤。　肉桂去麤皮。　乾薑炮。各半斤。

右爲末。蜜圓如梧桐子大。每服二十圓。溫米飲下。加至三十圓。食前。日二服。

【消飲圓】療酒癖停飲。痰水不消。滿逆嘔吐。目暗耳聾。脇下急痛。腹中水聲。

茯苓去皮。　乾薑炮。各三兩。　白朮八兩。　枳實麩炒。半兩。

右爲末。蜜圓如梧子大。每服五十圓。溫水飲下。不計時。

【化痰玉壺圓】治風痰吐逆。頭目眩。胸膈煩滿。飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星　半夏並生用。各一兩。　天麻半兩。　頭白麵三兩。

右爲細末。滴水圓如梧桐子大。每服三十圓。水一大盞。先煎令沸。下藥煮五七沸。候藥浮。卽熟漉出放溫。別用生薑湯下。不拘時。

【辰砂化痰圓】治風化痰。安神定志。利咽膈。清頭目。止咳嗽。除煩悶。

白礬枯過別研　辰砂研飛各半兩　半夏湯洗七次生薑汁同搗和作麵三兩

天南星炮一兩

右半夏麵白礬天南星爲末和勻生薑汁煮麵糊圓如梧桐子大用硃砂爲衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒一圓搥碎生薑薄荷湯下

【金珠化痰圓】治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實欬嗽咽嗌不利

辰砂研飛二兩　生白龍腦細研半兩　皁莢子炒黃色　白礬光明者於石鐵器內煅汁盡放令研　鉛白霜細研　天竺黃研各一兩　金箔爲衣二十片

半夏湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皁莢仁爲末與諸藥研勻生薑汁煮麵糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食後臨臥服

【玉液圓】治風壅化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏湯洗七次爲末　白礬枯過各十兩　寒水石燒通赤出火毒水飛過三十兩

右合研以白麵糊爲圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨臥服

【玉芝圓】治風壅痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱痰唾稠粘

白茯苓去皮　人參去蘆　天南星用米泔浸一大時焙乾

乾薄荷葉　白礬枯過各三十兩　半夏湯洗七次爲末生薑汁和作麵六十兩

右爲細末用生薑汁煮麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如痰盛躁熱薄荷湯下

【桔梗湯】除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮去穰　半夏生薑汁製　桔梗細剉微炒各十兩　枳實去穰麩炒赤黃五兩

右爲末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

【胡椒理中圓】治肺胃虛寒氣不宣通欬嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花去枝梗　葶藶　陳皮去白　乾薑炮

高良薑剉炒　甘草炙　細辛去苗　胡椒各四兩

白朮五兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日二服

【備急五嗽圓】治五種欬嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鰓嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐臥不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之

皁莢去皮炙黃去子　肉桂去麤皮　乾薑炮各半斤

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大，每服十五圓，溫酒下，米飲亦得，食前服。

【大阿膠圓】治肺虛客熱，咳嗽氣急，胸中煩浮，肢體倦疼，咽乾口燥，渴欲飲冷，多唾涎沫，或有鮮血，肌瘦發熱，減食嗜臥，又治或因叫怒，或卽房勞，肺胃致傷，吐血嘔血。

熟乾地黃　白茯苓去皮。　乾山藥　五味子

阿膠炒，各一兩。　貝母炒，去心。　柏子仁炒，去殼。　麥門冬

百部根　茯神去木。　杜仲去麤皮，剉，炒。　丹參各半兩。

防風去蘆叉。　人參去蘆。　遠志去心，各一分。

右爲細末，煉蜜和圓，每兩作二十四圓，每服一圓，水一中盞，煎至六分，和滓溫服，少少嚥呷，不拘時候。

【百部圓】治肺氣不調，咳嗽喘急，胸膈煩悶，唇乾口燥，面目浮腫，咽嗌不利，積久不瘥，咯唾膿血者，亦宜服之。

天門冬去心，一斤。　肉桂去麤皮，四兩。　瓜蔞根十六兩。　黑參八兩。

馬兜鈴　紫菀去苗洗。　紫蘇葉，各二十二兩。　百部根

黃耆　杏仁湯浸去皮尖，炒令黃色，各六兩。

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大，每服十五圓，煎烏梅甘草湯下，食後服。

【款冬花散】治寒壅相交。肺氣不利。欬嗽喘滿。胸膈煩悶。痰實涎盛。喉中呀呷。鼻塞清涕。頭痛眩冒。肢體倦疼。咽嗌腫痛。

款冬花去枝梗。　桑葉洗焙。　知母去蘆。各二十兩。　貝母去心。麩炒。
杏仁去皮尖。麩炒。　半夏湯洗七次。薑製。　阿膠剉。炒。　甘草爁。各二斤半。
麻黃去節。五斤。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。食後溫服。

【鍾乳補肺湯】治肺氣不足。欬嗽上氣。胸滿上迫。喉咽閉塞。短氣喘乏。連唾不已。寒從背起。口中如含霜雪。語無音聲。甚者唾血。腸臭。乾嘔心煩。耳聞風雨聲。皮毛悴。面色白。

款冬花去枝梗。　紫菀洗去土。　人參去蘆。　五味子揀。
白石英碎如米粒。　肉桂去麤皮。各二兩。　麥門冬去心。　桑白皮炙。
鍾乳碎如米粒。各三兩。

右除白石英鍾乳外。同爲麤末。與白石英等同拌勻。每服四錢。水二盞。生薑五片。大棗一枚。粳米三十粒。煎至一盞。用綿濾去滓。食後溫服。

【華蓋散】治肺感寒邪。欬嗽上氣。胸膈煩滿。項背拘急。聲重鼻塞。頭昏目眩。痰氣不利。呀呷有聲。

麻黃去根節。　紫蘇子隔紙炒。　桑白皮炙。　杏仁去皮尖。炒。

赤茯苓去皮。　陳皮去白。各一兩。　甘草炙。半兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。去滓。食後溫服。

【丁香半夏圓】治脾胃宿冷。胸膈停痰。嘔吐惡心。吞酸噫氣。心腹痞滿。脇肋刺痛。短氣噎悶。不思飲食。

陳皮去白。　丁香　肉豆蔻仁　木香

人參各一分。　藿香葉半兩。　半夏湯洗七次。以生薑汁炒黃色。三兩。

右爲細末。以生薑汁煮麵糊爲圓。如小豆大。每服二十圓。生薑湯下。不計時候。

【藿香散】溫脾胃。化痰飲。消宿冷。止嘔吐。治胸膈痞滿。腹脇脹痛。短氣噎悶。痰嘔痰水。噫氣吞酸。噦逆惡心。

半夏切作四片。薑汁浸一宿。以粟米炒黃。　厚朴去麤皮。薑汁製。　藿香葉

甘草炙。各一兩。　陳皮去白。半兩。

右爲麤散。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。去核同煎七分。去滓。稍熱服。不計時日三服。及治山嵐瘴氣。

紹興續添方

【二陳湯】治痰飲爲患。或嘔吐惡心。或頭眩心悸。或中脘不快。或發爲寒熱。或因食生冷。脾胃不和。

半夏湯洗七次。　橘紅各五兩。　白茯苓三兩。　甘草一兩半。炙。

右爲咬咀。每服四錢。用水一盞。生薑七片。烏梅一箇。同煎六分。去滓。熱服。不拘時候

【溫肺湯】治肺虛久客寒引發則喘欬。不能坐臥。嘔吐痰沫。可思飲食。

白芍藥六兩。　五味子去梗炒。　乾薑炮。　肉桂去麤皮。

半夏煮熟焙。　陳皮去白。　杏仁去皮尖。　甘草炒。各三兩。

細辛去蘆洗。二兩。

右件剉麤散。每服三大錢。水一盞半。煎至八分。以絹濾汁。食後服。一方去白芍藥細辛二味。可加減用。

寶慶新增方

【麻黃散】治丈夫婦人久近肺氣。咳嗽喘急上衝。坐臥不安。痰涎壅塞。欬唾稠粘。脚手冷痹。心脇疼脹。兼治傷風咳喘。膈上不快。

麻黃十兩。去根節。　款冬花去蘆枝梗。　訶子皮去核。　甘草爐。各五兩。

□桂六兩。去皮。不見火。杏仁三兩。去皮尖。麩炒。

右爲細末。每服二錢。水一盞。入好茶一錢。同煎八分。食後夜臥通口服。如半夜不能煎。但以藥末入茶和勻。沸湯點。或含嚥亦得。忌魚酒炙煿猪肉腥臊物。

【人參養肺圓】治肺胃俱傷。氣奔於上。客熱熏肺。欬嗽氣急。胸中煩悸。涕唾稠粘。或有鮮血。上氣喘急。不

得安臥肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮恐懼度水跌臥或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔血並治之

人參去蘆　黃耆去蘆密塗炙各一兩八錢　白茯苓

瓜蔞根各六兩　杏仁二兩四錢去皮尖麩炒　半夏麴四兩炒

皁角子三百箇炒

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯送下

【人參訶子圓】治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲不出痰涎不利欬嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

訶子　龍腦薄荷葉　藿香去梗洗淨　縮砂仁各一兩

百藥煎　葛粉各八兩　甘草五兩　烏梅肉三兩

右爲末麵糊爲圓每服一二圓含化嚥津食後臨臥

【溫中化痰圓】治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈好臥減食咳嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之又方見後

良薑去蘆炒　陳皮去白　青皮去白　乾薑炮各五兩

右爲細末醋打麵糊圓如梧桐子大每服三五十粒湯飲任下不拘時

【新法半夏湯】治脾胃氣弱。痰飲不散。嘔逆酸水。腹脇脹痞。頭旋惡心。不思飲食。

縮砂仁　草菓仁　橘紅洗去白。　神麴炒各一兩

白豆蔻仁　丁香各半兩。　甘草生炙二兩。

大半夏四兩。湯浸洗七次。每箇切作兩片。用白礬末一兩沸湯浸一晝夜。漉出。別用湯洗去礬。俟乾。一片切作兩片。再用生薑自然汁。於銀盂中浸一晝夜。却於湯中頓。令薑汁乾盡。以慢火焙燥爲細末。再用生薑自然汁溲成餅子。曝乾。或焙燥炙黃。勿令色焦。

右爲細末。每服一錢。先用生薑自然汁調成膏。入炒鹽少許。沸湯點服。

【丁香五套圓】治胃氣虛弱。三焦痞澀。不能宣行水穀。故爲痰飲。結聚胸膈之間。令人頭目昏眩。胸膈脹滿。痰嗽氣急。嘔吐腹疼。伏於中脘。亦令臂疼不舉。腰腿沉重。久而不散。流入於脾。脾惡濕。得水則脹。脹則不能消化水穀。又令腹中虛滿而不食也。此藥主之。

天南星每箇切作數片。同半夏先用水浸三日。每日易水。次用白礬二兩。研。調水再浸三日。洗焙。

半夏切破。各二兩。　乾薑炮。　白朮　良薑

茯苓各一兩。　青皮　陳皮　丁香

木香各半兩。

右爲細末。用神麯一兩。大麥蘗二兩。同碾取末。打糊和藥爲圓。如梧桐子大。每服五十圓至七十圓。溫熱水下。不拘時候。常服溫脾胃。去宿冷。消留滯。化飲食。辟霧露風冷。山嵐瘴氣。不正非時之氣。但是酒癖停飲。痰水不消。累服湯藥不能作効者。服之如神。

【縮砂圓】溫中散滯。消飲進食。治胸膈噎悶。心腹冷疼。大能煖化生冷果食。夏月不可闕此。

縮砂仁一兩。　高良薑　天南星湯浸洗七次。焙乾。秤各四兩。

右爲細末。生薑自然汁。煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服五十圓至七十圓。生薑湯下。不拘時候。

【深白圓】治膈脘痰涎不利。頭目昏暈。吐逆涎沫。

生硫黃別研。　天南星生。　半夏生。各一兩　盆硝

元精石各半兩。　附子一枚。六錢重者。生去皮臍。

右爲細末。入細麵三兩令停。水糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。沸湯內煮令浮。漉出。生薑湯下。食後服。

【破飲圓】治一切停飲不散。時嘔痰沫。頭眩欲倒。膈脘不快。

旋覆花八兩。　白朮一斤一兩。　肉桂去麤皮。　乾薑炮。各六兩。

枳實麩炒。二兩。　赤茯苓去麤皮。七兩。

右爲末。麵糊圓。如梧桐子大。每服五十圓。熱水下。

吳直閣增諸家名方

【溫中化痰圓】治證與前溫中化痰圓同。

半夏煮。　乾薑炮。各一兩。　白朮焙。二兩。　細辛去葉洗。

胡椒各半兩。

右爲細末。生薑汁打麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓至五十圓。湯飲任下。不拘時候。

【養中湯】治脾胃受寒。欬嗽多痰。胸滿短氣。語聲不出。晝夜不止。飲食減少。不以遠年日近。並皆治之。

罌粟殼去蒂蓋蜜刷炙。二兩半。　半夏麴八錢。炙。　肉桂去麤皮。

甘草燔。各半兩。

右爲細末。每服一大錢。水一盞。生薑四片。同煎至七分。通口服。不拘時候。

【人參款花膏】治肺胃虛寒。久嗽不已。咽膈滿悶。欬嗽痰涎。嘔逆惡心。腹脇脹滿。腰背倦痛。或虛勞冷嗽。及遠年日近一切嗽病。服諸藥不效者。並皆治之。

款冬花去梗。　五味子去梗。炒。　紫菀去蘆洗。　桑白皮去赤皮。

人參各一兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。如鷄頭大。每服一圓。食後細嚼。淡薑湯送下。或每一大圓。分作四小圓。含化亦得。

【橘皮半夏湯】治肺胃虛弱。好食酸冷。寒痰停積。嘔逆惡心。涎唾稠粘。或積吐。粥藥不下。手足逆冷。目眩身重。又治傷寒時氣。欲吐不吐。欲嘔不嘔。昏憒悶亂。或飲酒過多。中寒停飲。喉中涎聲。乾噦不止。

陳皮去白。　半夏煮。各七兩。

右爲麤散。每服三錢。生薑十片。水二盞。煎至一中盞。去滓。溫服。不計時候。

續添諸局經驗祕方

【人參潤肺圓】治肺氣不足。咳嗽喘急。痰涎不利。胸膈煩悶。漱唾稠粘。脣乾口燥。及療風壅痰實。頭目昏眩。精神不爽。或肺胃俱虛。久嗽不已。漸成虛勞。肢體羸瘦。胸滿短氣。行動喘乏。飲食減少。或遠年日近諸般欬嗽。並皆治之。

人參　款冬花去枝梗。　細辛去葉。洗。　杏仁去皮尖。麩炒。

甘草爁。各四兩。　肉桂去麤皮。　桔梗各五兩。　知母六兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。如鷄頭大。每服一圓。食後細嚼。淡薑湯送下。含化亦得。

【定喘瑞應丹】專治男子婦人。久患欬嗽。肺氣喘促。倚息不得睡臥。累年不瘥。漸致面目虛浮。

蟬蛻洗去土足。翅炒。　杏仁去皮尖。炒。　馬兜鈴各二兩。　煆砒六錢。

右爲細末。蒸棗肉爲圓。如葵子大。每服六七圓。臨臥用葱茶清放冷下。服後忌熱物半日。

【人參清肺湯】治肺胃虛寒。欬嗽喘急。胸膈噎悶。腹肋脹滿。迫塞短氣。喜欲飲冷。咽嗌隱痛。及療肺痿勞

嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

人參　地骨皮　阿膠炙炒　杏仁去皮尖炙炒

知母　桑白皮　甘草　罌粟殼

烏梅去核

右等分㕮咀爲麤散每服三錢水盡半烏梅棗各一枚同煎至一盞濾去滓食後臨臥溫服兩滓併煎作一服

【新法半夏湯】治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛臟腑膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐酒噦逆惡心頭疼煩渴倦怠嗜臥不思飲食並宜服之

青皮去白　乾薑炮各六兩　陳皮去白　桔梗炒各一斤

丁皮四兩　甘草炒十二兩　半夏湯洗薑汁製二兩半

右爲細末每服一錢入鹽一捻沸湯點服不拘時候常服溫和三焦開胃健脾消宿酒進飲食

【人參定喘湯】治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上喘氣急喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒邪欬嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參去蘆切片　半夏麴　麻黃去節　甘草炙

阿膠炒各一兩　桑白皮　五味子各一兩半　罌粟殼蜜炙二兩

右爲麤末。入人參片拌勻。每服三大錢。水一盞半。生薑三片。同煎七分。去滓。食後溫服。又治小兒久病肺氣喘急。喉中涎聲。胸膈不利。嘔吐痰沫。更量歲數加減服。

【細辛五味子湯】治肺經不足。胃氣怯弱。或冒風邪。或停寒有飲。欬嗽倚息。不得安臥。胸滿迫塞。短氣減食。乾嘔作熱。嗽唾結痰。或吐涎沫。頭目昏眩。身體疼重。語聲不出。鼻塞清涕。頭目脚膝時帶虛浮。痰欬不止。痛引胸脇。不問新久。並宜服之。

北細辛去苗。　半夏湯浸洗。各一兩。　烏梅去核。　甘草炙。各一兩半。

罌粟殼去蒂蓋。炒。　五味子各三兩。　桑白皮炒。二兩。

右爲麤散。每服三錢。水二盞半。生薑十片。煎至一盞。去滓。溫服。兩滓併煎。

【茯苓半夏湯】治停痰留飲。胸膈滿悶。咳嗽嘔吐。氣短惡心。以致飲食不下。並宜服之。

茯苓去皮。三兩。　半夏湯洗七次。五兩。

右爲麤末。每服四大錢。水一大盞。生薑七片。煎至七分。去滓。空心服。

【人參藿香湯】治男子婦人脾胃氣弱。嘔吐噦逆。飲食不下。手足逆冷。涎痰稠粘。又治似喘不喘。欲嘔不嘔。徹心憒憒。悶亂不安。或瘴癘諸疾。水漿粥藥入口便吐。服此立效。久病翻胃。服之百日安。此藥溫脾胃。化痰飲。消宿冷。止吐嘔。

人參二兩。切片。　藿香去梗。各六兩。　半夏湯洗七次。薑汁製。二兩半。

右爲麤末。入人參令勻。每服三錢。水一盞半。生薑十片。煎至一盞。去滓。通口服。孕婦忌。

【半夏圓】治肺氣不調。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。心下堅滿。短氣煩悶。及風壅痰實。頭目昏眩。咽膈不利。嘔吐惡心。神思昏憒。心忪面熱。涕唾稠粘。並皆治之。

白礬枯過。十五兩。　半夏三斤。湯洗去滑。薑汁浸一宿。

右爲細末。生薑自然汁爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。加至三十圓。食後臨臥時。生薑湯下。

【杏參散】除痰下氣。治胸脇脹滿。上氣喘急。倚息不得睡臥。神思昏憒。

桃仁　杏仁各去皮尖。麩炒。　桑白皮蜜炙微赤。用米泔浸一宿焙乾。

人參去蘆。

右等分爲細末。每服二錢。水一盞半。生薑三片。棗一枚。煎七分。溫服。不拘時候。

【杏子湯】治一切咳嗽。不問外感風寒。內傷生冷。及虛勞咯血。痰飲停積。悉皆治療。

人參去蘆。　半夏湯洗七次。　茯苓去皮。　細辛去苗葉。

乾薑炮洗。　甘草炙。　官桂去皮。不見火。　芍藥去粉。

五味子去苗。各等分。

右㕮咀。每服四錢。水盞半。杏仁去皮尖。剉五枚。薑五片。煎至六分。去滓。食前服。若感冒得之。加麻黃等分。如脾胃素實者。用罌粟殼去筋碎剉。以醋淹炒等分加之。每服添烏梅一箇煎服。其效尤驗。若

嘔逆惡心者。不可用此。○一法去杏仁。人參。倍加麻黃。添芍藥。如麻黃之數。乾薑五味子各增一半。名小青龍湯。大治久年咳嗽。痰涎壅盛。夜不得睡。仍專治脚氣喘急。此方雖用麻黃。既有官桂。不致於發汗。服之不妨。○一方加麻黃。甘草。五味子。杏仁。茯苓等分。橘紅倍之。尤爲切當。○一方用紫蘇葉。桑白皮。麻黃。青皮。五味子。杏仁。甘草等分。生薑七片。烏梅一箇。煎服。久年咳嗽。氣虛喘急。皆得其宜。二方中有麻黃。有汗人不宜服之。

【四七湯】治喜怒悲思憂恐驚之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核。在咽喉之間。咯不出。嚥不下。此七氣之所爲也。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲中節。嘔逆惡心。並宜服之。

紫蘇葉二兩。　厚朴三兩。　茯苓四兩。　半夏五兩。

右㕮咀。每服四錢。水盞半。薑七片。棗一箇。煎至六分。去滓。熱服。不拘時候。若因思慮過度。陰陽不分。清濁相干。小便白濁。用此藥下青州白圓子。最爲切當。婦人惡阻。尤宜服之。一名厚朴半夏湯。一名大七氣湯。局方有七氣湯。用半夏五兩。人參官桂甘草各一兩。生薑煎服。大治七氣。幷心腹絞痛。然藥味太甜。恐未必能止疼順氣。○一方治七情所傷。中脘不快。氣不升降。腹脇脹滿。用香附子炒半斤。橘紅六兩。甘草一兩。煎服尤妙。好事者謂其耗氣。則不然。蓋有是病服是藥也。

增廣太平惠民和劑局方卷五

補虛損　附骨蒸

【臘肭臍圓】補虛壯氣。煖腎祛邪。益精髓。和脾胃。進飲食。悅顏色。治五勞七傷。眞氣虛憊。臍腹冷痛。肢體酸疼。腰背拘急。脚膝緩弱。面色黧黑。肌肉消瘦。目暗耳鳴。口苦舌乾。腹中虛鳴。脇下刺痛。飲食無味。心常慘戚。夜多異夢。晝少精神。小便滑數。時有餘瀝。房室不舉。或夢交通。及一切風虛痼冷。並宜服之。

臘肭臍一對。慢火酒炙。令熟。　沉香　神麴炒。各四兩。

精羊肉一斤。熟細切碎。爛研。　羊髓取汁。一斤。

無灰酒一斗。同上六味於銀器內慢火熬成膏。放冷。入下藥。

肉豆蔻去殼。炮。　木香慢製。　丁香

補骨脂酒炒。　天麻去苗。　川芎

胡蘆巴　鍾乳煉成粉。　青皮去白。

紫蘇子炒。　陽起石用漿水煮一日。細研。飛過。焙乾。

山藥一兩半。　肉蓯蓉四兩。淨洗切片子。焙乾。

肉桂去麤皮。　大腹子　檳榔各二兩半。

大附子半斤炮去皮臍用青鹽半斤漿水一斗五升煮水令盡切焙乾

右爲細末入前膏內溲成劑於臼內搗千餘杵爲圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下鹽湯亦得

【兔絲子圓】治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便澁數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰明耳目

兔絲子洗酒浸　鹿茸酥炙去毛剉　肉桂去麤皮　附子炮去皮臍

石龍芮去土　澤瀉各一兩　巴戟去心　防風去苗叉

肉蓯蓉酒浸切焙　杜仲去麤皮剉炒　茴香炒　沉香

白茯苓去皮　牛膝酒浸一宿　石斛去根　續斷

山茱萸去核　補骨脂炒　熟乾地黃酒蒸　葶藶茄各三分

桑螵蛸酒浸炒　五味子　覆盆子去枝萼　芎藭各半兩

右爲末以酒煮麵糊圓如梧桐子大每服二十圓溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

【金鈆石斛圓】治眞氣不足。元臟虛弱。頭昏面腫。目暗耳鳴。四肢疲倦。百節酸疼。脚下隱痛。步履艱難。肌體羸瘦。面色黃黑。鬚髮脫落。頭皮腫痒。精神昏困。手足多冷。心胸痞悶。遶臍刺痛。膝脛酸疼。不能久立。腰背拘急。不得俛仰。兩脇脹滿。水穀不消。腹痛氣刺。發歇作時。心懸噫醋。嘔逆惡心。口苦咽乾。喫食無味。恍惚多忘。氣促喘乏。夜夢驚恐。心忪盜汗。小便滑數。或水道澁痛。一切元臟虛冷之疾。並皆治之。常服補五臟。和血脈。駐顏色。潤髮進食。肥肌大壯筋骨。

川烏頭炮。去皮臍。　金鈴子麩炒。　石斛去根。　茴香炒。
赤小豆　馬蘭子醋炒。　羌活去蘆。各八兩。　地龍去土。炒。
巴戟天去心。　胡蘆巴炒。　川椒去目炒。各四兩。　蒼朮去浮皮。
烏藥各十六兩。　青鹽二兩。

右爲細末。酒煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫酒下。鹽湯亦得。空心食前。

【何首烏圓】補煖腑臟。祛逐風冷。利腰膝。强筋骨。黑髭髮。駐顏容。此藥性溫無毒。久服輕身。延年不老。

牛膝一斤。去苗。剉。　何首烏三斤。用銅刀或竹刀切如碁子大。木杵臼中搗。

右以黑豆一斗。淨洗曝乾。用甑先以豆薄鋪甑底。然後薄鋪何首烏。又鋪豆。又薄鋪牛膝。如此重重鋪。令藥豆俱盡。安於釜上蒸之。令豆熟爲度。去黑豆。取藥曝乾。又換豆蒸之。如此三遍。去豆取藥。候乾爲末。蒸棗肉和圓。如梧桐子大。每服三十圓。溫酒下。食前服。忌蘿蔔葱蒜。

【石南圓】治風毒脚弱少力。脚重疼痹。脚腫生瘡。脚下隱痛。不能踏地。脚膝筋攣。不能屈伸。項背腰脊、拘急不快。風毒上攻、頭面浮腫。或生細瘡。出黃赤汁。或手臂少力。或口舌生瘡。牙齒宣爛。齒搖髮落。耳中蟬聲。頭眩氣促。心腹脹悶。小便時澀。大便或難。

石南葉　當歸去蘆。　薏苡仁　川芎

赤芍藥　麻黃去根節。　陳橘皮　牽牛炒。

赤小豆　大腹皮連皮用。　杏仁去皮尖及雙仁。麩炒黃赤色。各二兩。

五加皮　牛膝去苗。各三兩。　木瓜　獨活去蘆。

杜仲剉。炒。　菟絲各四兩。

右爲細末。以酒浸蒸餅爲圓。如梧桐子大。每十圓至十五二十圓。木瓜湯下。早起。日中。臨臥。各一服。常服補益元氣。筋骨壯健。耳目聰明。婦人血氣亦可服。不拘時候。

【八味圓】治腎氣虛乏。下元冷憊。臍腹疼痛。夜多旋溺。脚膝緩弱。肢體倦怠。面色黧黑。可思飲食。又治脚氣上衝。少腹不仁。及虛勞不足。渴欲飲水。腰重疼痛。少腹拘急。小便不利。或男子消渴。小便反多。婦人轉胞。小便不通。並宜服之。

白茯苓去皮。　牡丹皮　澤瀉各三兩。　熟地黃八兩。酒製。

山茱萸去核。　山藥各四兩。　附子炮。去皮臍。　肉桂去麤皮。各二兩。

右爲末。煉蜜圓如梧桐子大。每服十五圓至二十五圓。溫酒空心食前。日二服。久服壯元陽益精髓。活血駐顏。強志輕身。

【黃耆圓】治丈夫腎臟風虛上攻。頭面虛浮。耳內蟬聲。頭目昏眩。項背拘急。下注腰脚。脚膝生瘡。行步艱難。脚下隱疼。不能踏地。筋脈拘攣。不得伸屈。四肢少力。百節酸疼。腰腿冷痛。小便滑數。及癱緩風瘡。遍身頑麻。又療婦人血風。肢體痒痛。脚膝緩弱。起坐艱難。並宜服之。

川烏頭炮。去皮臍。　川楝子　地龍去土。炒。　茴香炒。

杜蒺藜炒。去刺。　赤小豆　防風去蘆頭。　黃耆剉。各一兩。

烏藥剉。二兩。

右爲細末。酒煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服十五圓。溫酒下。鹽湯亦得。婦人醋湯下。並空心服。

【茴香圓】治丈夫元臟久虛。冷氣攻衝。臍腹絞痛。腰背拘急。面色萎黃。飲食減少。及膀胱小腹氣痛。幷腎臟風毒。頭面虛浮。目暗耳鳴。脚膝少力。腫痛生瘡。婦人血臟虛冷。食減力少。肢體疼痛。久服補虛損。除風冷。壯筋骨。明耳目。

蔵靈仙洗去土。　防風去苗。　川烏頭炮。去皮臍。　陳皮去白。

川楝子　草薢各三兩。　烏藥係好烏藥。剉去土。五兩。

赤小豆　茴香炒。各八兩。　川椒去目及閉口者。微炒出汗。二兩。

地龍炒去土一兩

右爲細末酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下二十圓鹽湯亦得小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下婦人血臟虛冷溫醋湯下臍腹絞痛滑泄冷痢濃煎艾湯下

【五補圓】補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟乾地黃　人參去蘆　牛膝去苗酒浸一宿焙乾

白茯苓去皮　地骨皮去土各等分

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下空心服加至五十圓日三服服至半月覺氣壯即服七宣圓二三日覺氣散即還服五補圓久服去百病髭髮黑潤

【無比山藥圓】治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痹骨疼腰膓不隨飲食雖多不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥補經脈起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃強筋練骨輕身明目除風去冷

熟乾地黃酒浸　赤石脂煅　巴戟去心　茯神去皮木

山茱萸去核　牛膝剉酒炒　澤瀉各五兩　乾山藥二兩

五味子揀六兩　肉蓯蓉酒浸四兩　兔絲子酒浸研　杜仲去皮炒各三兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十至三十圓食前溫酒或溫米飲下服七日後令人身輕健

體潤澤唇口赤手足煖面光悅身體安音聲響是其驗也十日後長肌肉此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

【大山萸圓】治虛損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸唇口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背强痛臍腹弦急嗜臥少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服愈風氣百疾

山萸七兩半　甘草炙七兩　芎藭　杏仁酒浸去皮麩炒

麥門冬去心　防風去蘆叉　白芍藥　白朮各一兩半

白茯苓去皮　柴胡去蘆　桔梗各一兩二錢半　熟乾地黃

當歸去蘆洗焙酒製　大豆黃卷炒　肉桂去皮各二兩半　阿膠炒

人參各一兩七錢半　白斂　乾薑各七錢半　大棗一百箇蒸熟去皮核

右爲細末煉蜜與蒸棗同和圓如彈子大服一圓溫酒或米飲化下嚼服亦可食前

【定志圓】治心氣不定五臟不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝瘥暮劇暮瘥朝劇或發狂眩並宜服之常服益心强志令人不忘

白茯苓去皮　人參去蘆頭各三兩　遠志去苗及心　菖蒲各二兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大朱砂爲衣每服七圓加至二十圓溫米飲下食後臨臥日三服

【黃耆建中湯】治男子女人諸虛不足。小腹急痛。脇肋膜脹。臍下虛滿。胸中煩悸。面色萎黃。唇口乾燥。少力身重。胸滿短氣。腰背强痛。骨肉酸疼。行動喘乏。不能飲食。或因勞傷過度。或因病後不復。常並宜服之。

白芍藥六兩。　肉桂去麤皮。　黃耆去蘆。各三兩。　甘草炙剉。二兩。

右爲麤散。每服三錢。水一盞半。生薑三片。大棗一枚。煎至一中盞。去滓。入錫少許。再煎令鎔。稍熱服。空心食前。

【人參黃耆散】治虛勞客熱。肌肉消瘦。四肢倦怠。五心煩熱。口燥咽乾。頰赤心忪。日晚潮熱。夜有盜汗。胸脇不利。減食多渴。欬唾稠粘。時有膿血。

赤芍藥　紫菀　知母　黃耆

桑白皮炒。　甘草炙。各十五兩。　人參去蘆。　桔梗各十兩。

地骨皮去土。　秦艽去土。　茯苓去皮。　生乾地黃

柴胡去苗。各二十兩。　半夏湯浸七次。去滑。用生薑汁製。十五兩。　鱉甲去裙。醋炙一兩。

天門冬去心。三十兩。

右爲細末。每服二大錢。水一盞。煎七分。去滓。溫服。食後。

【成煉鍾乳粉】主五勞七傷。欬逆上氣。治寒嗽。通音聲。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛。療脚弱冷疼。下焦傷竭。强陰。久服延年益壽。令人有子。

鍾乳不拘多少。

右取韶州鍾乳。無問厚薄。但顏色明淨光澤者。卽堪入鍊。惟黃赤兩色不任用。欲鍊亦不拘多少。置鍾乳於金銀器中。卽以大鐺中著水。沉金銀器於鐺中煮之。常令如魚眼沸水。減卽添。若薄乳。三日三夜卽得。若麤厚管者。卽七日七夜。候乳色變黃白卽熟。如疑生。更煮滿十日最佳。煮訖。出金銀椀。其鐺內煮乳黃濁水弃之。勿令人服。損人咽喉。傷人肝肺。令人頭痛。兼復下利不止。其有犯者。食猪肉卽愈。弃此黃水訖。更着清水。準前更煮。經半日許。卽出之。其水色清不變。卽止。乳無毒矣。卽於磁鉢中。用玉鎚着水研之。其鉢及鎚。須夾白鍊袋。籠口稍長。作之使鎚得轉。兼通上下。每日着水。攪令勻。勿使着鎚鉢。卽封繫鍊袋自作記。勿使人開。一卽免纖塵入。二卽免研人竊喫。研覺乾澁。卽是水盡。卽更添水。常令如稀米泔狀。乳細者。皆浮在上。粗者。沉在下。復繞鎚鉢四邊研之。不及者。卽粗細不勻。爲此。每日須一開或二開。攪括令勻。勿使着搥。卽得勻熟。免有麤細。研至四五日。狀若乳汁。研搭視之。狀如書中白魚。膩卽成自然光白。便以水洗之。不隨水落者。卽熟。若得水而落者。卽未成。更須研之。以不落爲限。熟訖。澄取曝乾。每服秤半兩。分爲三服。用溫酒調下。空腹服。更量病輕重加減。兼可合和用鍾乳圓散。

【玉霜圓】治眞氣虛憊。下焦傷竭。臍腹弦急。腰脚疼痛。精神困倦。面色枯槁。或亡血盜汗。遺瀝失精。大便自利。小便滑數。肌肉消瘦。陽事不舉。久服續骨聯筋。秘精堅髓。却老還童。安魂定魄。換肌秘氣。輕身壯陽。

益壽住世。

白龍骨一片，粘舌者，細搗羅後，研如粉，以水飛過三度了，日中曝乾，用黑豆一斗，內蒸一伏時，以夾絹袋盛，曝乾。　牡礪火煅成粉。　紫梢花如無，以木賊代之，各三兩。　牛膝酒浸炙，乾秤。　磁石醋淬七度。　澤瀉洗，酒浸一宿，炙。　石斛去根炙。　朱砂研飛。　肉蓯蓉去鱗皮，洗，酒浸一宿，炙乾，各二兩。　茴香舶上者，微炒。　肉桂去皮，各一兩。　兔絲子酒浸一伏時，蒸熟杵羅爲末，去浮者。　韭子微炒，五兩。　鹿茸半兩，用連頂骨者，去毛，淨，約三寸，截斷，酒浸一伏時，慢火炙脆。

天雄十兩，長大者，酒浸七日了，掘一地坑，以半秤炭火燒坑通赤，速去火，令淨，以醋二升，沃於地坑內，候乾，乘熱便投天雄在內，以盆合土擁之，經宿後取出，去皮臍。

右爲細末，煉酒蜜各半，和圓如梧桐子大，每服三十圓，空心晚食前溫酒下，常服，補眞氣，壯筋骨，異夢寤即驚魘，或發狂眩暴，不知人，並宜服之。

【預知子圓】治心氣不足，志意不定，神情恍惚，語言錯妄，忪悸煩鬱，愁憂慘戚，喜驚多恐，健忘少睡，夜多

預知子去皮。　人參去蘆。　山藥　石菖蒲

枸杞子揀淨。　遠志去心。　黃精蒸熟。　白茯苓去皮。

柏子仁　朱砂研飛。　茯神去木。　地骨皮去土。

右各等分爲細末，煉蜜圓如龍眼核大，以朱砂爲衣，每服一圓，細嚼人參湯下，不拘時。

紹興續添方

【安腎圓】治腎經久積陰寒，膀胱虛冷，下元虛憊，耳重唇焦，腰腿腫疼，臍腹撮痛，兩脇刺脹，小腹堅痒，下部濕疼，夜夢遺精，恍惚多驚，皮膚乾燥，面無光澤，口淡無味，不思飲食，大便溏泄，小便滑數，精神不爽，事多健忘，補元陽，益腎氣。

川烏頭炮去皮臍　肉桂去皮，各十六兩　石斛去根，酒浸，製　桃仁麩炒

白蒺藜炒去刺　白朮　破故紙炒　菟絲

白茯苓　山藥　肉蓯蓉酒浸　巴戟各四十八兩

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，溫酒或鹽湯下，空心食前，小腸氣，炒茴香鹽酒下。

【麝香鹿茸圓】益眞氣，補虛憊，治下焦傷竭，臍腹絞痛，兩脇脹滿，飲食減少，肢節煩疼，手足麻痹，腰腿沉重，行步艱難，目視茫茫，夜夢鬼交，遺泄失精，神情不爽，陽事不舉，小便滑數，氣虛腸鳴，大便白痢，虛煩盜汗，津液內燥。

熟乾地黃十斤　五味子二斤　附子一百四十箇，炮，去皮臍

蓯蓉三斤，酒浸一宿，乾　山藥四斤　鹿茸燎，去毛，酒浸，炙，七十兩

杜仲三斤，牛去麤皮，炒，去絲　牛膝一斤四兩，酒浸一宿

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每一斤圓子，用麝香末一錢爲衣，每服二十粒，溫酒吞下，鹽湯亦得，食前服。○宋嘉定十年十二月申明改正。

【妙香散】治男子婦人心氣不足，志氣不定，驚怖悲憂慘戚，虛煩少睡，喜怒不常，夜多盜汗，飲食無味，頭目昏眩。

茯苓去皮，不焙。　茯神去皮木，各一兩。　人參　桔梗炒。
甘草各半兩。　薯蕷薑炙。　遠志去心，炒。　黃芪各一兩。
辰砂三錢，別研。　麝香一錢，別研。　木香二錢半，煨。

右爲細末，每服二錢，溫酒調服，常服補氣血，安神鎮心。

寶慶新增方

【養氣丹】治諸虛百損，脾元耗憊，眞陽不固，三焦不和，上實下虛，中脘痰飲上攻，頭目昏眩，八風五痹，或卒暴中風，痰潮上膈，言語蹇澁，神昏氣亂，狀若癲癎，及奔豚腎氣上衝，胸腹連兩脇，膨脹刺痛，不可忍者，陰陽上下氣不升降，飲食不進，面無精光，肢體浮腫，五種水氣，脚氣上衝，腰背倦痛，夜夢鬼交，覺來盜汗，胃冷心疼，小便滑數，牽引小腹，足膝緩弱，步履艱難，婦人血海久冷，赤白帶下，歲久無子，及陰毒傷寒，面青舌卷，陰縮難言，四肢厥冷，不省人事者，急服百圓，用生薑大棗煎湯灌之，即便回陽，命無不活，或觸冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，六脈沉伏，唇口青黑，腹脇攻刺，及男子陽事痿怯，脚膝酸疼，腹臍虛鳴，大便自

滑兼療膈胃煩壅痰飲虛鳴百藥不愈者常服助養眞氣生陽逐陰溫平不僭消磨冷滯尅化飲食使五臟安寧六腑調暢百病不侵出入道塗宜服此藥隨行緩急服餌大有功效

禹餘糧石半斤　代赭石各火煉七次又醋淬七次一斤　磁石火煉十次醋淬十次

紫石英　赤石脂各火煅一次各半斤

已上各研爲細末又以水研挹其清者貯之紙上用筲箕盛欲使細末在紙上候水盡滴乾各用藏餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以好硬炭五十斤分爲五處每一處用炭十斤燒紅作一爐子煅此五藥以紙灰蓋之兩日後火盡灰冷則再煅如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入下藥

破故紙酒炒香熟　茴香炒　沉香不見火　巴戟鹽湯浸打去心

肉豆蔻麵裹煨熟　丁香　木香不見火　肉桂去麤皮

白茯苓去皮　山藥　遠志去心　附子炮去皮臍

川當歸酒浸一宿　鹿茸酥炙各一兩　蓯蓉淨洗酒浸一宿焙乾一兩半

已上各如法修製同研爲末却入

五靈脂　沒藥各去炒石研　乳香別研細各一兩

已上三味入衆藥同研却入

鍾乳粉　陽起石略煅　朱砂或煅或蒸各一兩

以上三味，別研臨時入。

右同爲細末，用糯米粉煮糊爲圓，每兩作五十圓，陰乾，入布袋內擦令光瑩，每服五圓至十圓，空心溫酒下，或薑鹽湯，或棗湯下，亦得。婦人艾醋湯下。

【朴附圓】治脾元虛弱，飲食遲化，食必多傷，腹痛腸鳴，臟腑滑洩，晝夜無度，胃氣虛損，不美飲食，嘔噦惡心，此藥性溫，兼治醃胃惡心及久患脾洩冷瀉之人最宜服此。

附子炮去皮臍，　厚朴各一斤，薑汁製，　乾薑炮，三斤，　神麴炒，八兩，

右爲細末，酒煮麵糊圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心食前，米飲或鹽湯下亦得。

【川練散】治膀胱小腸氣痛，臍下撮痛，上衝心腹，面色痿黃，脚下癮痛，四肢倦怠，不思飲食，夜多旋溺，外腎瘙痒。

川楝子蒸，去皮核，　破故紙炒，　茴香炒，各四兩　乾薑一兩，炮，

胡蘆巴三兩，酒炒，　附子一兩半，炮，去皮臍，

右爲細末，每服二錢，空心食前，熱酒調下。

【雙和湯】治男子婦人五勞六極七傷，心腎俱虛，精血氣少，遂成虛勞，百骸枯瘁，四肢倦怠，寒熱往來，咳嗽咽乾，行動喘乏，面色萎黃，略有所觸，易成他疾，或傷於冷，則宿食不消，脾疼腹痛，瀉痢吐逆，或傷於熱，則頭旋目暈，痰涎氣促，五心煩熱，或因飢飽動作，喜怒驚恐，病隨而至，或虛脹而不思食，或多食而不生

飢肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥七兩半　黃耆去蘆蜜炙　當歸洗去蘆酒製　熟地黃酒洗蒸

川芎去蘆各三兩　甘草炙　肉桂去麤皮不見火各二兩二錢半

右爲細末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至六分空心食前服忌生冷菓子等物

【平補鎮心丹】治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡臥不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱又方見後

山藥洗淨盡汁製炒　天門冬去心　熟地黃酒洗蒸　遠志去心甘草煮

龍齒各一兩半　麥門冬去心　五味子去梗皮　肉桂去皮不見火

茯神去木　白茯苓去皮　車前子去沙土研破各一兩二錢半

人參去蘆五錢　朱砂細研半兩爲衣　酸棗仁去皮隔紙微炒二錢半

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心飯飲下溫酒亦得加至五十圓常服益精髓養氣血悅色駐顏

【十四味建中湯】治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體羸瘠短氣嗜臥寒熱頭痛咳嗽喘促吐嘔痰沫手足多冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜臥汗多夢寐驚悸小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲食全虧

白芍藥剉。　白朮洗。　肉蓯蓉洗去泥。酒浸一宿。焙乾。
麥門冬去心。　甘草炙。　熟地黃洗去泥。酒蒸一宿。焙乾。
白茯苓去皮。　川芎洗。　半夏湯洗七次。　肉桂去麤皮。
人參去蘆。　黃耆炙。　當歸洗去蘆。酒浸。焙。　附子炮。去皮臍。

右等分。咬咀爲麤散。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗一枚。煎至一盞。去滓。食前溫服。

【思仙續斷圓】治脾腎風虛。毒氣流注。腿膝酸疼。艱於步履。小便遺瀝。大便後重。此藥補五臟內傷。調中。益精。涼血。堅强筋骨。益智。輕身延年。

防風去蘆叉。　川烏頭炮。去皮臍。　杜仲各二兩。去麤皮。薑汁製。炒斷絲。
木瓜三兩。去穰。　薏苡仁炒。　牛膝各四兩。洗。去蘆。好酒浸一宿。
續斷　萆薢各六兩。

右爲末。酒糊圓。每服三十至五十圓。溫酒鹽湯空心下。

【黃耆六乙湯】治男子婦人諸虛不足。肢體勞倦。胸中煩悸。時復焦渴。唇口乾燥。面色痿黃。不能飲食。或先渴而欲發瘡癰。或病癰疽而後渴者。宜服此。常服補血氣。安和五臟。

甘草一兩。炙。　黃耆六兩。去蘆。蜜塗炙

右咬咀。每服二錢。水一盞。棗一枚。煎七分。溫服。不拘時。

【木瓜圓】治腎經虛弱。腰膝沉重。腿脚腫痒。痃破生瘡。脚心癮痛。筋脈拘攣。或腰膝緩弱。步履艱難。舉動喘促。面色黧黑。大小便秘澁。飲食減少。無問新久。並宜服之。

狗脊去毛。六兩。　木瓜去穰　大艾各四兩。去梗糯米糊調成餅焙乾爲末。
蒺藜去盧。酒浸。製。　天麻去蘆　當歸酒浸。製。　牛膝去土酒浸一宿。
草薢各二兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。漸加至三十圓。空心食前溫酒下。鹽湯亦得。

【茱萸內消圓】治腎與膀胱經虛。爲邪氣所搏。結成寒疝。伏留不去。臍腹疼刺。小腸氣痛。奔豚痃癖。疼不可忍。陰核偏大。膚囊墜腫。結硬牽急。重大滋長。瘾痒疼痛。時出黃水。瘡瘍腰腿沉重。足脛腫滿。行步艱難。累經治療。不見減瘥。服之漸漸內消。不動大腸。亦不搜絞。補虛消疝。溫養腎經。此藥不熱。無毒。若志心服餌。其效如神。

吳茱萸湯洗七次。　陳皮浸洗。去白。　山藥焙　川楝子蒸。去皮核。
山茱萸去核。　青皮浸洗。去白。　茴香炒。　馬蘭花醋炙。
肉桂去麤皮。各二兩。　木香一兩。不見火。

右爲細末。酒糊圓如梧桐子大。每服三十圓至五十圓。空心溫酒或鹽湯吞下。

【青娥圓】治腎氣虛弱。風冷乘之。或血氣相搏。腰痛如折。起坐艱難。俛仰不利。轉側不能。或因勞役過多。

傷於腎經。或處卑濕地氣傷腰。或墜跌傷損。或風寒客搏。或氣滯不散。皆令腰間似有物重墜。起坐艱辛者。悉皆治之。又方見後。

胡桃二十箇。去殼皮。　破故紙酒炒。八兩。　蒜四兩。熬膏。　杜仲薑汁炒。十六兩。

右爲細末。蒜膏爲圓。每服三十圓。空心溫酒下。婦人淡醋湯下。常服壯筋骨。活血脈。烏髭鬢。益顏色。

淳祐新添方

【接氣丹】治眞元虛憊。陰邪獨盛。陽氣暴絕。或大吐大瀉。久痢虛脫等病。餘同黑錫丹治狀。此藥尤佳。

肉蓯蓉酒浸。　牛膝酒浸。　白朮焙。各半兩。　桂心去麤皮。

肉豆蔻煨。　茴香炒。　附子炮。去皮臍。　木香

陽起石煅。　沉香　川楝子去核。用肉。　胡蘆巴炒。

破故紙炒。各一兩。　丁香三錢。　黑錫去滓秤。　硫黃研。各二兩。

右件藥并砂子四兩。並搗爲細末。和停。用糯米粉酒煮糊圓。如梧桐子大。溫酒鹽湯。空心下五十圓。

【寧志膏】治心臟虧虛。神志不守。恐怖驚惕。常多恍惚。易於健忘。睡臥不寧。夢涉危險。一切心疾。並皆治之。

酸棗仁微炒。去皮。　人參去蘆。各一兩。　辰砂研細水飛。半兩。　乳香一分。細研。

右各研和停。煉蜜圓如彈子大。每服一粒。溫酒化下。棗湯亦得。空心臨臥服。

【三仙丹】治腎經虛寒。元氣損弱。神衰力怯。目暗耳聾。常服補寶下經。溫養脾胃。壯氣搜風。駐顏注血。增筋力。烏髭鬚。

茴香三兩。炒令香透。　蒼朮二兩。米泔浸一宿刮去皮切碎。取葱白一握同炒黃色去葱。

川烏頭一兩。生。去皮。剉作骰子塊。用鹽半兩。同炒黃色去鹽。

右爲細末。酒煮麵糊圓。如梧桐子大。每服至七十圓。空心溫酒鹽湯下。○又名長壽丹。

【樂令建中湯】治血氣勞傷。五臟六腑虛損。腸鳴神倦。榮衞不和。退虛熱。除百病。

白芍藥　前胡去蘆。　桂心　黃耆蜜炙。

白茯苓　人參去蘆。　細辛　當歸去土。

麥門冬去心。　陳皮去白。　甘草炙。各一兩。　半夏洗七次。七錢半。

右㕮咀。每服四錢。水一盞。棗四片。薑一箇。同煎至七分。去滓。微熱服。不拘時候。

【金鈴子圓】治腎氣發動。牽引疼痛。臍腹弦急。攻衝不足。

益智仁　巴戟去心。　胡蘆巴炒。　破故紙炒。

石菖蒲　茴香微炒。各二兩。　金鈴子去核。四兩。　白茯苓去皮。

陳橘皮去白。　木香各一兩。

右爲末。酒煮麵糊圓。梧桐子大。每服五十圓。鹽湯溫酒下。

吳直閣增諸家名方

【張走馬玉霜圓】療男子元陽虛損。五臟氣衰。夜夢遺泄。小便白濁。臍下冷疼。陽事不興。久無子息。漸至瘦弱。變成腎勞。眼昏耳鳴。腰膝酸疼。夜多盜汗。並宜服之。自然精元秘固。內施不泄。留濁去清。精神安健。如婦人宮藏冷。月水不調。赤白帶下。久無子息。面生黯黯。髮退不生。肌肉乾黃。容無光澤。服之大效。

破故紙炒。　巴戟去心。各四兩。　茴香六兩。焙。　川楝子麩炒。

大川烏用蚌粉半斤炒。去蚌不用。各八兩

右爲細末。酒打麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三五十圓。溫酒下。鹽湯亦得。空心食前。

【降心丹】治心腎不足。體熱盜汗。健忘遺精。及服熱藥過多。上盛下虛。氣血不降。小便赤白。稠濁不清。常服鎮益心神。補虛養血。秘精氣。益丹田。

熟乾地黃洗。焙。　麥門冬去心。　天門冬去心。　當歸去蘆洗。各三兩。

白茯苓去皮。　茯神去皮木。　遠志甘草煮。去蘆骨。　人參各二兩。

肉桂去粗皮。不見火。　朱砂研飛。各半兩。

右爲細末。煉蜜圓如梧桐子大。每服三十圓。人參湯下

【四神丹】治百病。補五臟。遠疫癘。却嵐瘴。除尸疰。蠱毒。辟鬼魅邪氣。大治男子婦人眞元虛損。精髓耗傷。形羸氣弱。中滿下虛。致水火不交。陰陽失序。精神困倦。面色枯槁。亡血盜汗。遺瀝失精。大便自利。小便滑

數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脈拘攣及一切沉寒痼冷痃癖疝瘕臍腹絞痛久瀉久痢傷寒陰證脈候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎臟久冷絕孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不瘥悉皆治之此丹假陰陽造化之功得天地中和之氣卽與尋常一煅一煉僭燥丹藥功效不同此丹活血實髓安魄定魂悅澤顏色輕身保命苟不恃藥力縱其情慾久久服之可通仙道

雄黃　雌黃　硫黃　朱砂並研各五兩

右入磁盒內將馬鞭草爲末鹽泥固濟慢火四圍燒煅一日一夜取出再研細以糯米粽研糊圓如豆大每服一粒絕早新汲水下姙婦不可服忌羊血葵菜

【十全大補湯】治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動氣血喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫煖脾胃

白茯苓焙　白朮焙　人參去蘆　熟乾地黃酒蒸

白芍藥　粉草炙　黃耆去蘆　肉桂去麤皮不見火

川當歸去蘆洗　川芎各等分

右爲麤散每服二大錢水一盞生薑三片棗子二箇同煎七分不拘時溫服此藥補虛損大有神效

【黃耆鱉甲散】治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸

脇不利。減食多渴。咳唾稠粘。時有膿血。

桑白皮炙。　半夏煮。　黃耆蜜炙。　知母去蘆。

赤芍藥洗。　甘草爐。　紫菀去蘆各二兩半。　秦艽去蘆。

白茯苓焙。　生乾地黃洗焙。　地骨皮去土。　柴胡洗各三兩三錢。

苦桔梗　肉桂去麤皮不見火。　人參各一兩六錢半。　鱉甲醋浸去裙炙酥。

天門冬各五兩去心焙。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。煎至七分。去滓。食後溫服。

【秦艽鱉甲散】治男子婦人氣血勞傷。四肢倦怠。肌體瘦弱。骨節煩疼。頭昏頰赤。肢體枯槁。面色痿黃。唇焦口乾。五心煩熱。痰涎欬嗽。腰背引痛。乍起乍臥。夢寐不寧。神情恍惚。時有盜汗。口苦無味。不美飲食。及治山嵐瘴氣。寒熱往來。

天仙藤　前胡去蘆。　秦艽去蘆洗。　鱉甲醋浸去裙炙酥。

陳皮去白。　貝母去心。　柴胡去蘆洗。　荊芥去梗。

青皮去白。　甘草爐各一兩。　乾葛二兩焙。　肉桂去麤皮不見火。

羌活　白芷各半兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。生薑三片。同煎八分。稍熱服。不拘時。酒調亦得。常服養氣血。調榮衛。解

【沉香鱉甲散】治男子婦人五勞七傷。氣血虛損。腰背拘急。手足沉重。百節酸疼。面色黃黑。肢體倦怠。行動喘乏。胸膈不快。欬嗽痰涎。夜多異夢。盜汗失精。嗜臥少力。肌肉瘦瘁。不思飲食。日漸羸弱。一切勞傷虛損。並皆治之。

沉香不見火。　人參去蘆。　巴戟去心。
白茯苓焙。　牛膝去蘆。酒浸。　秦艽去蘆。洗。　大黃不見火。
川當歸去蘆。洗。　柴胡去蘆。　半夏薑汁浸二宿。焙炒令黃色。
綿黃耆去蘆。　鱉甲醋浸。去裙。炙酥。　肉桂去麤皮。各一兩。
荊芥去梗。各半兩。　附子炮。去皮臍。　乾熟地黃去蘆。　羌活各七錢半。
肉豆蔻四箇。　全蝎二錢半。

右爲細末。每服二錢。水一盞。葱白二寸。生薑三片。棗子二枚。同煎七分。空心食前服。

【小兔絲子圓】治腎氣虛損。五勞七傷。小腹拘急。四肢酸疼。面色黧黑。唇口乾燥。目暗耳鳴。心忪氣短。夜夢驚恐。精神困倦。喜怒無常。悲憂不樂。飲食無味。舉動喘乏。心腹脹滿。脚膝痿緩。小便滑數。房室不舉。股內濕痒。水道澀痛。小便出血。時有遺瀝。並宜服之。久服填骨髓。續絕傷。補五臟。去萬病。明視聽。益顏色。輕身延年。聰耳明目。

兔絲子五兩。酒浸。　山藥內七錢半。爲糊。　石蓮肉各二兩。　白茯苓焙。一兩。

右爲細末.用山藥糊溲和爲圓.如梧桐子大.每服五十圓.溫酒或鹽湯下.空心服.如脚膝無力.木瓜湯下.

續添諸局經驗祕方

【沉香鹿茸圓】治眞氣不足.下元冷憊.臍腹絞痛.脇肋虛脹.脚膝緩弱.腰背拘急.肢體倦怠.面無精光.唇口乾燥.目暗耳鳴.心忪氣短.夜多異夢.晝少精神.喜怒無時.悲憂不樂.虛煩盜汗.飲食無味.舉動力乏.夜夢鬼交.遺泄失精.小便滑數.時有餘瀝.陰間濕痒.陽事不興.並宜服之.

沉香一兩.　鹿茸去毛.酒炙.三兩.　附子炮.去皮臍.四兩.　巴戟去心.二兩.

熟乾地黃洗淨.酒洒蒸焙.六兩.　兔絲子酒浸.研.焙.五兩.

右爲細末.入麝香一錢半.別研和勻.煉蜜爲圓.如梧桐子大.每服四五十粒.好酒或鹽湯空心下.常服養眞氣.益精髓.明視聽.進食駐顏.

【椒附圓】補虛壯氣.溫和五臟.治下經不足.內挾積冷.臍腹弦急.痛引腰背.四肢倦怠.面色黧黑.唇口乾燥.目暗耳鳴.心忪短氣.夜多異夢.晝少精神.時有盜汗.小便滑數.遺瀝白濁.脚膝緩弱.舉動乏力.心腹脹滿.不進飲食.並宜服之.極煖下元.治腎氣乏及療腰疼.

五味子　陳皮去白.　牽牛微炒.　乾薑炮.

石菖蒲各一兩.　附子炮.去皮臍.　川椒去目.炒出汗.　檳榔各半兩.

右八味，剉碎，以好米醋於磁器內，用文武火煮令乾，焙爲細末，醋煮麵糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，鹽酒或鹽湯空心食前下。婦人血海冷，當歸酒下；泄瀉，飯飲下；冷痢，薑湯下；赤痢，甘草湯下。

【平補鎮心丹】治證與前平補鎮心丹同。

熟乾地黃　麥門冬　柏子仁　茯神
生乾地黃　天門冬　乾山藥各七兩。　當歸去蘆六兩。
苦桔梗炒。　辰砂各三兩，研爲衣。　遠志去心七兩，以甘草煮三四沸。
石菖蒲揀節密者，十六兩。　龍骨一兩。

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，空心飯飲下，溫酒亦得，漸加至五十圓。

【青娥圓】治證與前青娥圓同。

胡桃肉三十箇，去皮膜，別研如泥。　補骨脂用脂麻同於銀器內炒熟。
杜仲皮去麤皮，剉，麩炒黃，去麩，乘熱略杵碎，又用酒洒勻再炒，各六兩。

右爲細末，入研藥令勻，酒糊圓，如梧桐子大，每服三五十圓，溫酒鹽湯下，空心食前服。

【威喜圓】治丈夫元陽虛憊，精氣不固，餘瀝常流，小便白濁，夢寐頻洩，及婦人血海久冷，白帶白漏，白淫，下部常濕，小便如米泔，或無子息。

白茯苓去皮四兩，作塊，用猪苓一分，同於磁器內煮二十餘沸，取茯苓，日乾，去猪苓爲末，

右鎔黃蠟四兩。溲爲圓。如彈子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥服。以小便清爲度。忌米醋。忌使性氣。

【遠志圓】治丈夫婦人心氣不足。腎經虛損。思慮太過。精神恍惚。健忘多驚。睡臥不寧。氣血耗敗。遺瀝泄精。小便白濁。虛汗盜汗。耳或聾鳴。悉皆主之。

遠志去心。薑汁炒。　牡蠣煅取粉。各二兩。　肉蓯蓉淨洗。切片。焙乾。四兩。

人參去蘆。　白茯苓去皮。　辰砂別研。　乾薑炮。各一兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三十粒。空心食前。煎燈心鹽湯下。溫酒亦可。此藥性溫無毒。常服補益心腎。聰明耳目。定志安神。滋養氣血。

【小安腎圓】治腎氣虛乏。下元冷憊。夜多旋溺。肢體倦怠。漸覺羸瘦。腰膝沉重。嗜臥少力。精神昏憒。耳作蟬鳴。面無顏色。泄瀉腸鳴。眼目昏暗。牙齒蛀痛。

香附子　川楝子　川烏各一斤。用鹽四兩水四升同煮。候乾剉焙。

茴香十二兩。　熟乾地黃八兩。　川椒去目及閉口者。微炒出汗。四兩。

右爲細末。酒糊爲圓。如梧桐子大。每服二十圓至三十圓。空心臨臥。鹽湯或鹽酒下。常服補虛損。下元冷憊。

【三建丹】壯元陽。補眞氣。治勞傷虛損。下經衰竭。腎氣不固。精溺遺失。臟腑自利。手足厥冷。或脈理如絲。形肉消脫。或惡聞食氣。聲嘶失音。

陽起石火煅通紅　鍾乳粉　附子炮去皮臍各等分

右爲細末和勻用精米糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓米飲送下食前服忌豉汁羊血

【伏火二氣丹】治眞元虛損精髓耗傷腎氣不足面黑耳焦下虛上盛頭目眩暈心腹刺痛酸胃吐逆虛勞盜汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中漏下癥瘕塊癖此藥奪陰陽造化之功濟心腎交養之妙大補諸虛

硫黃四兩　黑錫　水銀　丁香不見火

乾薑各半兩

右先鎔黑錫後下水銀結砂子與硫黃一處再研成黑灰色次入餘藥研勻用生薑自然汁煮糊爲圓如梧桐子大每十粒至一十五粒濃煎生薑湯下空心食前

【靈砂】性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄通血脈止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛酸胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨煙焰飛走男女老幼皆可服

水銀一斤　硫黃四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟焰卽以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口錢線扎縛瞇乾鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎子裂筆醮赤石脂頻抹其處火盡爲度經宿取出研爲細末糯米

糊爲圓，如麻子大。每服三粒，空心棗湯米飲井花水，人參湯任下。量病輕重，增至五七粒。忌猪羊血，菜豆粉，冷滑之物。

【上丹】養五藏，補不足，固眞元，調二氣，和榮衞，保神守中，久服輕身耐老，健力美食，明目降心火，交腎水，益精氣，男子絕陽，房事不興，女子絕陰，不能妊娠，腰膝重痛，筋骨衰敗，面色黧黑，心勞志昏，寤寐恍惚，煩憒多倦，餘瀝夢遺，膀胱邪熱，五勞七傷，肌肉羸瘁，上熱下冷，難任補藥，服之半月，陰陽自和，容色肌肉光潤，悅澤開心意，安魂消食，養胃氣。

五味子半斤　肉蓯蓉酒浸　巴戟去心　百部酒浸一宿焙

蛇床子　白茯苓去皮　遠志去心　山藥

枸杞子　柏子仁別研　防風去叉　杜仲炒斷絲

兔絲子酒浸別研，各二兩。

右爲末，蜜圓如梧桐子大，食前溫酒鹽湯下三十圓。春煎乾棗湯，夏加五味子四兩，四季月加蓯蓉六兩，秋加枸杞子六兩，冬加遠志六兩。

【鹿茸四斤圓】治肝腎虛熱，淫於內，致筋骨痿弱，不自勝持，起居須人，足不任地，驚恐戰掉，潮熱時作，飲食無味，不生氣力，諸虛不足。

肉蓯蓉酒浸　熟地黃　牛膝酒浸　鹿茸燎去毛，酥炙

兔絲子酒浸別研　木瓜乾　杜仲酒浸　天麻各等分

右爲末蜜圓如梧桐子大每服五十圓溫酒米飲食前下

【元兔丹】治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

兔絲子酒浸通軟乘濕研焙乾別取末十兩　白茯苓　乾蓮肉各三兩

五味子酒浸別爲末七兩

右爲末別研乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊溲和所得搗數千杵圓如梧桐子大每服五十圓米湯下空心食前服

【龍齒鎮心丹】治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精面少色足脛酸疼

遠志去心炒　天門冬去心　熟地黃　龍齒水飛

山藥各六兩　麥門冬去心　五味子　地骨皮

茯神去皮木　白茯苓去皮　車前子炒　桂心各五兩

右爲末蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心溫酒或米湯任下

【羊肉圓】治眞陽耗竭下元傷憊耳輪焦枯面色黧黑腰重脚弱元氣衰微常服固眞補氣益精駐顏

補骨脂炒　胡蘆巴炒　川楝子炒　茴香炒

續斷炒去絲　附子炮去皮臍　茯苓各三兩　山藥炒

桃仁別研去尖麩炒　杏仁各二兩去皮尖麩炒別研

右爲末精羊肉四兩酒煮爛研極細入麵煮糊圓如梧桐子大鹽湯溫酒空心下三五十圓

【蓯蓉大補圓】治元臟虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香炮　附子炮去皮臍　茴香炒　蓯蓉酒浸

川椒炒去汗各十兩　桃仁炒去皮尖　胡蘆巴　牛膝酒浸

巴戟去心　白蒺藜炒去刺　五味子　黃芪

澤瀉各五兩　羌活　檳榔　天麻

川芎　桂心各二兩

右爲末蜜圓如梧桐子大鹽酒鹽湯空心下三五十圓

【十四友圓】補心腎虛怔忪昏憒神志不寧睡臥不安故經曰臟有所傷情有所倚人不能知其病則臥不安

白茯苓去皮　川當歸去蘆　肉桂去麤皮　人參

白茯神去木　熟地黃淨洗　阿膠蛤粉炒　黃耆

柏子仁別研　紫石英別研　遠志湯浸洗去心酒灑蒸炒乾

酸棗仁炒　辰砂一分別研　龍齒二兩別研

右爲末。同別研藥蜜圓梧桐子大。每三十圓。食後棗湯下。

【鍾乳白澤圓】治丈夫諸虛百損。五勞七傷。眞氣不足。元臟不固。神志俱耗。筋力頓衰。頭目眩暈。耳內虛鳴。心腹急痛。氣逆嘔吐。痰嗽喘促。胸膈脹滿。脾洩下痢。遺精便濁。厥冷自汗。脈微欲絕。婦人血海虛冷。崩漏不止。赤白帶下。經候不調。臍腹時痛。面無顏色。飮食不進。幷治一切虛勞之疾。

鍾乳粉二兩。　陽起石煆通紅。研。　附子炮。去皮臍。各一兩半。滴乳香別研。

白檀香末。各一兩。　麝香一錢。別研

右和勻。滴水溲成劑。分作六十圓。每服一圓。水一盞。煎化及七分。盡空心熱服。如急病不拘時。久服補益精血。助陽消陰。安心神。定魂魄。延年增壽。起死回生。

【三建湯】治眞氣不足。元陽久虛。寒邪攻衝。肢節煩疼。腰背酸痛。自汗厥冷。大便滑泄。小便白濁。及中風涎潮。不省人事。傷寒陰證。厥逆脈微。皆可服之。

大川烏　天雄　附子各去皮臍。炮。各等分。

右爲麤末。每服四錢。水二盞。生薑十五片。煎至八分。去滓。溫服。不拘時。

【十全飮】治諸虛百損。榮衞不和。形體羸瘦。面色痿黃。脚膝酸疼。腰背倦痛。頭眩耳重。口苦舌乾。骨熱內煩。心忪多汗。飮食進退。寒熱往來。喘嗽吐衄。遺精失血。婦人崩漏。經候不調。凡病後不復舊。及憂慮傷動血氣。此藥平補有效。

白茯苓　白朮　人參去蘆　桂去麤皮不見火
川當歸洗去蘆　川芎　黃耆去蘆　熟乾地黃洗淨
白芍藥　甘草炙各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分水滓溫服不拘時

治痼冷　附消渴

【二氣丹】助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇臍腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

肉桂去麤皮　硫黃細研各一分　乾薑炮
黑附子一枚去皮臍炮裂爲末半兩者

右並研勻細麵糊爲圓如梧桐子大每服三十圓煎艾鹽湯放冷下空心食前服

【崔氏烏頭圓】治風冷邪氣入乘心絡或腑臟暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脅乍瘥乍甚經久不瘥

川烏頭　附子各炮去皮臍　赤石脂各三兩　肉桂去麤皮
乾薑炮　蜀椒去目及閉口者炒出汗各二兩

右爲細末蜜圓如梧桐子大每服二圓溫酒下覺至痛處痛卽止若不止加五六圓以知爲度若早

服無所覺。至午時再服三圓。夜又三圓。若久心痛。每旦服三圓。加至十圓。盡一劑。遂終身不發。忌猪肉生葱。

【曹公卓錘乳圓】主五勞七傷。肺損氣急。瘵丈夫衰老。陽氣絕。手足冷。心中少氣。髓虛腰疼。脚痹體煩。口乾不能食。此藥下氣消食。長肌和中。安五臟。除萬病。

鍾乳粉二兩。　吳茱萸湯洗七次。焙乾。微炒。半兩。　石斛去根。

兔絲子酒浸搗。焙。各一兩。

右爲末。煉蜜圓如梧桐子大。每服七圓。空心溫酒或溫湯米飲下。日再服。訖。行數百步。飲溫酒三合。復行二三百步。覺口胸內熱。稍定。卽食乾飯豆醬。過一日如常。須暖將息。不得聞見屍穢等氣。亦不食麤臭陳惡食。初服七日內。勿爲陽事。過七日後任性。然亦不宜傷多。服過半劑。覺有效。卽相續服三劑。終身更無所忌。

【金液丹】固眞氣。暖丹田。堅筋骨。壯陽道。除久寒痼冷。補勞傷虛損。治男子腰腎久冷。心腹積聚。脇下冷癖。腹中諸蟲。失精遺溺。形羸力劣。脚膝疼弱。冷風頑痹。上氣衄血。咳逆寒熱。霍亂轉筋。虛滑下利。又治痔瘻濕蜃。生瘡下血不止。及婦人血結寒熱。陰蝕疽痔。

硫黃揀淨。去沙石。十兩。研細。飛過。用磁盒子盛。以水和赤石脂封口。鹽泥固濟。曝乾。地內先埋一小罐子。盛水令滿。安盒子在上。用泥固濟訖。慢火養七日七夜。候足。加頂火一斤煅。候冷取出。研爲極細末。

右藥末一兩。用蒸餅一兩。湯浸握去水。脈爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。多至百圓。溫米飲下。空心服之。又治傷寒陰證。身冷脈微。手足厥逆。或吐或利。或自汗不止。或小便不禁。不拘圓數。宜併服之。得身熱脈出爲度。

【橘皮煎圓】治久虛積冷。心腹疼痛。嘔吐痰水。飲食減少。脇肋虛滿。臍腹弦急。大腹虛滑。小便利數。肌膚瘦瘁。面色痿黃。肢體怠惰。腰膝緩弱。及治痃癖積聚。上氣欬嗽。久瘧久痢。腸風痔瘻。婦人血海虛冷。赤白帶下。久無子息。

陳橘皮湯浸洗去白取紅。十五兩爲細末。　鹿茸茄子者。燎去毛。擘開。酒浸炙乾。
肉蓯蓉酒浸。微炙　牛膝酒浸焙。　石斛去根。酒浸。　巴戟去心。
兔絲子酒浸。焙搗。　肉桂去麤皮。　當歸洗去蘆。焙。　乾薑炮裂。
吳茱萸水淘去浮。　杜仲去麤皮。薑汁炙。　附子炮去皮臍。　陽起石酒浸。研粉。
京三稜煨熟。搥碎。　厚朴去麤皮。薑汁炙。　草薢各三兩。　甘草炙。一兩。

右爲細末。以酒五升。於銀石器內。將橘皮末煎熬如餳。却將諸藥末入在內。一處溲和勻。仍入白內搗五百杵。圓如梧桐子大。每二十圓至三十圓。空心溫酒鹽湯下。

【附子理中圓】治脾胃冷弱。心腹絞痛。嘔吐泄利。霍亂轉筋。體冷微汗。手足厥寒。心下逆滿。腹中雷鳴。嘔噦不止。飲食不進。及一切沉寒痼冷。並皆治之。

人參去蘆　附子炮去皮臍　乾薑炮　甘草炙
白朮各三兩

右爲末煉蜜和圓每一兩分作十圓每服一圓以水一盞化破煎至七分空心食前稍熱服

【北亭圓】治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋滿脹刺痛面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜臥食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便泄利胸膈痞塞飲食不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎痃癖瘕聚飜胃吐食久痛久痢

陳橘皮去白洗焙　當歸去蘆剉炒　川芎　肉桂去麤皮
大附子炮去皮臍　厚朴去麤皮薑汁炙　胡椒　甘草炙剉
縮砂仁　乾薑炮各四兩　北亭醋淘去石別研　青鹽別研各二兩
五味子淨一兩半　白朮三兩　阿魏醋化去炒石別研半兩

右爲末用銀石鍋中入好酒醋五升白炒蜜一十兩先下北亭阿魏青鹽三味入細麵一升同煎稠粘便下藥末半斤更煎如稀麵糊漸漸入藥末煎所離火取出更以乾藥末和搜成劑搗一千杵圓如梧桐子大每服十五圓微嚼用生薑鹽湯或溫酒下空心服忌羊血豉汁

紹興續添方

【沉香華澄茄散】治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦

臟腑自利小便滑數

沉香　胡盧巴微炒　葦澄茄　肉桂去麤皮

茴香舶上者微炒　破故紙微炒　川楝子炮去核　巴戟去心

木香各一兩　附子炮去皮臍四兩　川烏炮去皮臍半兩　桃仁去皮尖炒二兩

右爲末每服二錢水一大盞入鹽少許煎八分去滓空心食前稍熱服如育腸小腸一切氣痛服之有效

寶慶新增方

【清心蓮子飲】治心中蓄積時常煩躁因而思慮勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受尅口舌乾燥漸成消渴睡臥不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順氣血

石蓮肉去心　白茯苓去皮　黃耆蜜炙　人參各七錢半

麥門冬去心　地骨皮　黃芩　甘草炙

車前子各半兩

右剉散每三錢麥門冬十粒水一盞半煎取八分去滓水中沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

【獨活寄生湯】治腎氣虛弱。腰背疼痛。此病因臥冷濕地。當風所得。不時速治。流入脚膝爲偏枯冷痹緩弱疼重。或腰痛脚重攣痹。宜急服此。

白芍藥　當歸酒浸焙乾。　防風去蘆。　人參

白茯苓去皮。　杜仲製炒斷絲。　細辛去苗。　桂心不見火。

熟地黃酒蒸。　牛膝去蘆酒浸。　秦艽去土。　芎藭

桑寄生　甘草炙。各二兩。　獨活三兩。

右爲剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。空心服。氣虛下痢。除地黃。併治新產腹痛。不得轉動。及腰脚擧痛。痹弱。不得伸屈。此湯最除風消血。肘後方。有附子一枚。無寄生人參甘草當歸。近人治歷節風。幷脚氣流注甚有效。

淳祐新添方

【人參養榮湯】治積勞虛損。四肢沉滯。骨肉酸疼。吸吸少氣。行動喘嗽。小腹拘急。腰背强痛。心虛驚悸。咽乾唇燥。飲食無味。陽陰衰弱。悲憂慘戚。多臥少起。久者積年。急者百日。漸至瘦削。五臟氣竭。難可振復。又治肺與大腸俱虛。咳嗽下痢。喘乏少氣。嘔吐痰涎。

白芍藥三兩。　當歸　桂心去麤皮。　甘草炙。

陳橘皮　人參　白朮煨。　黃耆各一兩。

熟地黃製。　五味子　茯苓各七錢半。　遠志炒去心半兩。

右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑三片。棗子一枚。煎七分。去滓。溫服。便精遺泄。加龍骨一兩。咳嗽。加阿膠。甚妙。

【鹿茸大補湯】治男子婦人諸虛不足。

白茯苓去皮。　鹿茸製。　杜仲剉炒去絲。　當歸酒浸。

肉蓯蓉酒浸焙。　黃耆炙各二兩。　石斛剉酒浸蒸。　白朮煨。

五味子　附子炮。　肉桂　人參

北芍藥　半夏各一兩半。　甘草半兩。　地黃熟者酒蒸三兩

右㕮咀。每服四錢。薑三片。棗一枚。水一盞二分。煎七分。空心帶熱服。及治產後血氣耗傷。一切虛損。

【養腎散】治腎氣虛損。腰脚筋骨疼痛。膝脛不能屈伸。久病脚膝緩弱。空心豆淋酒下。服訖麻痺少時。須臾疾隨藥氣頓愈。骨中痛、囓胡桃肉酒下。甚者三五服。風寒濕悉治之。

全蝎半兩。　天麻三錢。　蒼朮製一兩。

附子炮各二錢。

右爲細末。每服一字。空心溫酒調下。

【參香散】治心氣不寧。諸虛百損。肢體沉重。情思不樂。夜多異夢。盜汗失精。恐怖煩悸。喜怒無時。口乾咽

燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦瘁漸成勞瘵

白茯苓去皮　白朮煨　黃耆製　山藥

石蓮肉去心　人參各一兩　丁香　檀香

南木香各一分　烏藥　橘紅　乾薑炮

縮砂仁各半兩　甘草炙三分　沉香二錢一法有炮附子半兩

右爲剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一枚煎七分空心服常服補精血調心氣進飲食安神守中有效

吳直閣增諸家名方

【震靈丹】紫府元君南岳魏夫人方出道藏一名紫金丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化沖和之功大治男子眞元衰憊五勞七傷臍腹冷痛肢體酸疼上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐可食八風五痹一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子

赤石脂　紫石英　禹餘糧石火煅醋淬手撚得碎爲度

丁頭代赭石如餘糧炮製已上各四兩

已上四味，作小塊，入甘鍋內，鹽泥固濟，候乾用炭一十斤煅通紅，火盡爲度，入地坑埋，出火毒二宿。

滴乳香別研。　**五靈脂**去沙石研。　**沒藥**去沙石，各二兩。　**朱砂**一兩，水飛過。

右八味，各爲末，以糯米粉煮糊爲圓，如小鷄頭大，隂乾出光，每一粒空心溫酒或冷水下，常服鎮心神，駐顏色，溫脾腎，理腰膝，除尸疰蟲毒，辟鬼魅邪癘，久服輕身，漸入仙道，忌猪羊血，恐減藥力，婦人醋湯下，孕婦不可服。

【來復丹】鐵甕城八角杜先生方，一名正一丹。此藥配類二氣，均調陰陽，奪天地沖和之氣，乃水火既濟之方，可冷可熱，可緩可急，善治榮衛不交，養心腎不升降，上實下虛，氣閉痰厥，心腹冷痛，臟腑虛滑，不問男女老幼，危急之證，但有胃氣，無不獲安，補損扶虛，救陰助陽，爲效殊勝。

硝石同硫黃並爲細末，入罐內以微火微炒，用柳箆子不住手攪，令陰陽氣相入，不可火太過，恐藥力減，再研細，名二氣末。　**硫黃**舶上透明者。　**太陰元精石**研細，水飛，各一兩。

五靈脂須擇五臺山者，水澄去沙石，日乾利。　**陳橘皮**去白。　**青皮**去白，各二兩。

右爲五靈脂，二橘皮爲細末，次入元精石末，及前二藥末拌勻，以好醋打糊爲圓，如豌豆大，每服三十粒，空心粥飲下，甚者五十粒，小兒三五粒，新生嬰兒一粒，小兒慢驚風，或吐利不止，變成虛風搐搦者，非風也，胃氣欲絕故也，用五粒研碎，米飲送下，老人伏暑迷悶，紫蘇湯下，婦人產後血逆上搶悶絕，并惡露不止，及赤白帶下，並用醋湯下，常服和陰陽，益精神，散腰腎陰濕，止腹脅冷疼，一應諸

疾不辨陰陽者。並宜服之。

【養正丹】出寶林眞人谷伯陽傷寒論中。一名交泰丹。却邪輔正。助陽接眞。治元氣虛虧。陰邪交蕩。正氣乖常。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。心神怯弱。夢寐驚悸。遍體盜汗。腹痛腰疼。或虛煩狂言。口乾上喘。飜胃吐食。霍亂轉筋。咳逆不定。又治中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫。四肢厥冷。如傷寒陰盛自汗。唇青脈沉。最宜服。及治婦人產後血氣身熱。月候不均。帶下腹痛。常服濟心火。强腎水。進飲食。

硫黃研細。　水銀　黑錫去滓淨。和與水銀結砂子。

朱砂細研。各一兩。

右用黑盞一隻。火上鎔黑鉛成汁。次下水銀。以柳枝子攪勻。次下朱砂。攪令不見星子。放下少時。方入硫黃末。急攪成汁和勻。如有焰。以醋洒之。候冷取出。研如粉極細。用糯米粉煮糊圓如菉豆大。每服二十粒。鹽湯下。此藥升降陰陽。既濟心腎。空心食前棗湯下。

【黑錫丹】丹陽慈濟大師受神仙桑君方。治脾元久冷。上實下虛。胸中痰飲。或上攻頭目徹痛。目瞪昏眩。及奔豚氣上衝。胸腹連兩脇膨脹。刺痛不可忍。氣欲絕者。及陰陽氣不升降。飲食不進。而黃羸瘦。肢體浮腫。五種水氣。脚氣上攻。及牙齦腫痛。滿口生瘡。齒欲落者。兼治脾寒心痛。冷汗不止。或卒暴中風。痰潮上膈。言語艱澀。神昏氣亂。喉中痰響。狀似癎緩。曾用風藥弔吐不出者。宜用此藥百粒。煎薑棗湯灌之。壓下風涎。即時甦省。風涎自利。或觸冒寒邪。霍亂吐瀉。手足逆冷。唇口青黑。及男子陽事痿怯。脚膝酸軟。行步

乏力。臍腹虛鳴。大便久滑。及婦人血海久冷。白帶自下。歲久無子。血氣攻注頭面四肢。並宜服之。兼療胸膈煩壅。痰飲虛喘。百藥不愈者。常服尅化飲食。養精神。生陽遂陰。消磨冷滯。除濕破癖。不動眞氣。使五臟安寧。六腑調暢。百病不侵。

金鈴子蒸去皮核。　胡蘆巴酒浸炒。　木香不見火。　附子炮去皮臍。
肉豆蔻麵裹煨。　破故紙酒浸炒。　沉香不見火。　茴香舶上者炒。
陽起石酒煮一日。焙乾研各一兩。　肉桂不見火半兩。　黑錫去滓淨秤。
硫黃透明者結砂子各二兩。

〔歌曰〕陰損陽衰實可傷。縱調榮衛亦難將。
氣羸血暈痰生者。試聽桑君爲發揚。
夫妻會合功成肆。鈴子沉香一兩賒。
朮附胡蘆陽起破。桂茴肉豆等無差。
梧桐酒糊精修煉。反老還童事可嘉。

右用黑盞或新鐵銚內。如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒。研細。餘藥並杵羅爲末。都一處和勻入研。自朝至暮。以黑光色爲度。酒糊圓梧桐子大。陰乾。布袋內擦令光瑩。每三四粒。空心鹽鹽湯或薑湯下。婦人艾醋湯下。

【玉華白丹】唐冲虛先生三品製煉方。曾經進宣政問。係上品丹。清上實下。助養根元。扶衰救危。補益臟腑。五勞七傷。夜多盜汗。肺萎虛損。久嗽上喘。霍亂轉筋。六脈沉伏。唇口青黑。腹脇刺痛。大腸不固。小便滑數。夢中遺泄。肌肉瘦瘁。目暗耳鳴。胃虛食減。久瘧久痢。積寒痼冷。諸藥不愈者。服之如神。及治腸風臟毒。

鍾乳粉煉成者一兩。　白石脂淨瓦閣起火煅紅。研細。水飛。

陽起石各半兩。用甘鍋盛于火中。煅令通紅。取出。酒淬。放在陰地上令乾。不可犯。

左顧牡蠣七錢。先用韭葉搗鹽泥固濟。火煅放冷。取白者。淨秤半兩。

右各研細如粉。方拌和作一處。勻研一二日。以糯米粉煮糊爲圓。如鷄豆大。入地坑出火毒一宿。每一粒。空心濃煎人參湯候冷送下。熱水亦得。常服溫平不僭不燥。澤肌悅色。祛除宿患。婦人久無姙者。以當歸熟地黃浸酒下。或久冷崩帶虛損。臍腹撮痛。艾醋湯下。服畢。以少白粥壓之。忌猪羊血葱豆粉。恐減藥力。

續添諸局經驗秘方

【金鎖正元丹】治眞氣不足。元臟虛弱。四肢倦怠。百節酸疼。頭昏眩痛。目暗耳鳴。面色黃黑。鬢髮脫落。頭皮腫痒。精神昏困。手足多冷。心胸痞悶。遶臍切痛。膝脛酸疼。不能久立。或脚弱隱痛。步履艱難。腰背拘急。不得俛仰。腹痛氣刺。兩脇虛脹。水穀不消。大便不調。嘔逆惡心。飲食減少。恍惚多忘。氣促喘乏。夜多異夢。心忪盜汗。小便滑數。遺精白濁。一切元臟虛冷之病。並治之。

五倍子　茯苓去皮各八兩　補骨脂酒炒十兩　紫巴戟去心
胡盧巴炒　蓯蓉淨洗焙各一斤　朱砂別研　龍骨各三兩

右爲細末入研藥令勻酒糊爲圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓空心食前溫酒下或鹽湯下

【祕傳玉鎖丹】治心氣不足思慮太過腎經虛損眞陽不固旋有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏此藥性溫不熱大有神效

五倍子十六兩　茯苓去皮四兩　龍骨二兩

右爲細末水糊圓每服四十粒空心鹽湯下日進三服

【巴戟圓】補腎臟暖丹田興陽道減小便塡精益髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌澀夢想虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰胯沉重百節酸疼項筋緊急背胛勞倦陰下盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脈不調或多或少赤白帶下並宜服之

紫金藤十六兩　良薑六兩　巴戟三兩　肉桂
吳茱萸各四兩　青鹽二兩

右爲末酒糊圓每服二十圓溫鹽酒送下鹽湯亦得日午夜臥各一服

【十補圓】治眞氣虛損下焦傷竭臍腹强急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消

渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五藏行榮衛益精髓進飲食

破故紙炒　厚朴去麤皮薑汁浸　肉桂去麤皮　附子炮

赤石脂煅　遠志去心薑汁浸炒　巴戟去心　乾薑炮

兔絲子酒浸軟別研細已上各一兩　川椒去目及閉口者炒出汗二兩

右爲末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫酒鹽湯下

【正元散】治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之

紅豆炒　陳皮去白　乾薑炮　人參去蘆

白朮　茯苓去皮　甘草炙各二兩　附子炮去皮臍

川芎　烏藥去木　山藥薑汁浸炒　乾葛各一兩

川烏炮去皮臍　肉桂去皮各半兩　黃耆炙一兩半

右爲細末每服二錢水一盞薑三片棗子一枚鹽少許煎至七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

【茯兔圓】治心氣不足思慮太過腎經虛損眞陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兔絲子五兩　白茯苓三兩　石蓮去殼二兩

右爲細末.酒煮糊爲圓.如梧桐子大.每服三十圓.空心鹽湯下.常服鎮益心神.補虛養血.清小便.

增廣太平惠民和劑局方卷六

積熱

【紫雪】療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾疥刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癎百病

石膏　黃金一百片與藥煮過不用　寒水石　磁石　滑石

已上四味各三斤搗碎水一斛煮至四斗去滓入下項

犀角屑　羚羊角屑　青木香搗碎　沉香搗碎各五兩

元參洗焙搗碎　升麻各一斤　甘草剉炒八兩　丁香一兩搗碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項

朴硝精者十斤　消石四升如闕芒硝亦得每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木棍攪不住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

麝香當門子一兩二錢半研

已上二味入前藥中攪調令勻安之二日

右件藥成霜雪紫色。每服一錢或二錢。用冷水調下。大人小兒臨時以意加減。食後服。

【紅雪通中散】治煩熱。黃疸脚氣溫瘴。解酒毒。消宿食。開三焦。利五臟。爽精神。除毒熱。破積滯。去腦悶。治眼昏頭痛。鼻塞口瘡。重舌腸癰喉閉。及傷寒狂躁。胃爛發斑等病。並宜服之。

赤芍藥　人參去蘆　檳榔　枳殼去穰。麩炒黃。
淡竹葉　甘草生用。　木香各二兩。　羚羊角屑。
升麻　黃芩各三兩。　梔子去皮。　葛根
桑白皮　木通　大青去根。　藍葉各一兩半。
川朴硝十斤。　蘇枋六兩。　硃砂細研。一兩。　麝香細研。半兩。

右藥除硃砂麝香外。並細剉。以水二斗五升。煎至九升。去滓。更以綿濾過。再以煖火煎令微沸。然後下朴硝。以柳木篦攪勿住手。候凝。次下硃砂麝香等末。攪令勻。傾新瓷盆中。經宿卽成矣。細研每服一錢至二錢。新汲水調下。更量老小虛實臨時加減服。凡服寶霞丹者。先依上件服法。調此藥服訖。須臾更以熱茶投令宣瀉一兩行爲度。後服霞寶丹。立有效。

【涼膈散】治大人小兒臟腑積熱。煩躁多渴。面熱頭昏。唇焦咽燥。舌腫喉閉。目赤鼻衄。頷頰結硬。口舌生瘡。痰實不利。涕唾稠粘。睡臥不寧。譫語狂妄。腸胃燥澁。便溺秘結。一切風壅。並宜服之。

川大黃　朴硝　甘草爁。各二十兩。　山梔子仁。

薄荷葉去梗。　黃芩各十兩。　連翹二斤半。

右爲麤末。每二錢水一盞。入竹葉七片。蜜少許。煎至七分。去滓。食後溫服。小兒可服半錢。更隨歲數加減。服之得利下住服。

【洗心散】治風壅壯熱。頭目昏痛。肩背拘急。肢節煩疼。熱氣上衝。口苦唇焦。咽喉腫痛。痰涎壅滯。涕唾稠粘。心神煩躁。眼澁睛疼。及塞壅不調。鼻塞聲重。咽乾多渴。五心煩熱。小便赤澁。大便秘滯。並宜服之。

白朮一兩半。　麻黃和節。　當歸去苗。洗。　荊芥穗

芎藭　甘草爐。　大黃麵裹煨。去麵。切焙。各六兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。入生薑薄荷各少許。同煎至七分。溫服。如小兒鈐痘瘡疹欲發。先誑語多渴。及驚風積熱可服一錢。並臨臥服。如大人五臟壅實。欲要清轉。加至四五錢。乘熱服。

【八正散】治大人小兒心經邪熱。一切蘊毒。咽乾口燥。大渴引飲。心忪面熱。煩燥不寧。面目赤。睛疼唇焦。鼻衄口舌生瘡。咽喉腫痛。又治小便赤澁。或癃閉不通。及熱淋血淋。並宜服之。

車前子　瞿麥　扁蓄　滑石

山梔仁　甘草　木通　大黃麵裹煨。去麵切。各一斤。

右爲散。每服二錢。水一盞。入燈心煎七分。去滓。溫服。食後臨臥。小兒量力少少與之。

【龍腦飲子】治大人小兒蘊積邪熱。咽喉腫痛。赤眼口瘡。心煩鼻衄。咽乾多渴。睡臥不寧。及除痰熱咳嗽中暑煩躁。一切風壅。並宜服之。

縮砂仁　瓜蔞根各三兩。　甘草蜜炒。十六兩。　石膏四十兩。研。

藿香葉一斤半。　大梔子仁。微炒。二十兩。

右爲末。每服一錢至二錢。用新汲水入蜜調下。又治傷寒餘毒。潮熱虛汗。用藥二錢。水一盞。入竹葉五六片。煎至七分。溫服。並食後服。

【妙香圓】治丈夫婦人小兒諸疾。

辰砂飛研。九兩。　牛黃　龍腦　臘粉研。

麝香研。各三兩。　金箔九十片。研。　巴豆三百一十粒。去心膜。炒研細。

右合研勻。煉黃蠟六兩。入白沙蜜三分。同煉令勻。爲圓。每兩作三十圓。如治潮熱積熱。傷寒結胸發黃。狂走躁熱。口乾面赤。大小便不通。煎大黃炙甘草湯下一圓。毒利下血。煎黃連湯調臘粉少許。如患酒毒。食毒。菜毒。氣毒。風痰伏痞。吐逆等。並用臘粉龍腦米飲下。中毒。吐血。悶亂。煩躁欲死者。用生人血下。立愈。小兒百病驚癇。急慢驚風。涎潮搐搦。用龍腦臘粉蜜湯下。棗豆大二圓。諸積食積熱。頰赤煩躁。睡臥不寧。驚哭瀉利。並用金銀薄荷湯下。更量歲數加減。如大人及婦人因病傷寒時疾。陰陽氣交結。伏毒氣胃中乾躁。眼赤潮發。不定。再經日數七八日已下。至半月。日未安。醫所不明證候

脈息交亂者可服一圓或分作三圓亦可並用龍腦薰粉米飲調半盡已來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥圓瀉下如要却收水洗淨以油單紙裹理入地中五日取出可再與大人小兒依法服一圓救三人即不堪使如要藥速行即用針刺一眼子冷水浸少時服之即效更速

【龍腦鷄蘇圓】除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱欬嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜腎疸口苦常服聰明耳目開心益智

鷄蘇淨葉一斤即龍腦薄荷也　麥門冬四兩湯洗去心焙乾
生乾地黃末六兩後入膏　眞蒲黃微炒　阿膠炒微燥
眞銀州柴胡剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞取汁後入藥　人參各二兩
木通剉同柴胡浸各二兩　黃耆去蘆一兩　甘草炙一兩半

右除別研藥後入外並爲末好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲圓如豌豆大每服二十圓嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬子湯浸去心煎湯下並食後臨臥服悕血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

【牛黃涼膈圓】治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡臥不安口

乾多渴。唇焦咽痛。頷頰赤腫。口舌生瘡。

紫英石研飛。麝香研。龍腦各五兩。研。牛黃一兩一分。研。

寒水石粉煅。牙硝枯過。研細。石膏研細。各二十兩。甘草爐十兩。

天南星七兩半。牛膽製。

右爲末。煉蜜圓。每兩作三十圓。每一圓溫薄荷人參湯嚼食後服。小兒常服半圓。治急驚。一圓。並用薄荷湯化下。

【抱龍圓】治風壅痰實。頭目昏眩。胸膈煩悶。心神不寧。恍惚驚悸。痰涎壅塞。及治中暑煩渴。陽毒狂躁。

天南星牛膽製。十六兩。阿膠碎炒如珠。三兩。牛黃半兩。研。白石英研飛。

辰砂研。生犀角 麝香研。藿香葉各二兩。

雄黃研飛。四兩。金箔 銀箔研。各五十片。

右爲細末。入研藥令勻。用溫湯溲和爲圓。如雞頭實大。每服一圓。用新汲水化破。入鹽少許。食後服。

【甘露圓】治大人小兒風壅痰熱。心膈煩躁。夜臥不安。譫語狂妄。目赤鼻衄。口燥咽乾。瘡中暑解熱毒。

鉛白霜 龍腦各三分。甘草炙。一兩。

寒水石粉三十二兩

右爲末。糯米糊圓。如彈子大。每服用生薑蜜水磨下半圓。新汲水亦得。小兒一圓分五服食後。牙硝枯過。三兩。

【甘露飲】治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即肌煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並宜服之

熟乾地黃　麥門冬去心焙　枳殼去穰麩炒　甘草炙
山茵陳　枇杷葉刷去毛淨　石斛去蘆　黃芩
生乾地黃　天門冬去心焙

右等分爲末每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

【桂苓圓】【消暑圓】治證幷方見傷寒中暑類

寶慶新增方

【五淋散】治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並治之又方見後

赤茯苓六兩　當歸去蘆　甘草生用各五兩
赤芍藥去蘆剉各二十兩　山梔子仁

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎至八分。空心食前服。

【消毒麻仁圓】治諸般風氣上壅。久積熱毒。痰涎結實。胸膈不利。頭旋目暈。或因酒麵炙煿毒食所傷。停留心肺。浸淸腸胃。蘊蓄不散。久則內鬱血熱。腸風五痔。外則發瘡癰瘭。赤斑遊腫。渾身燥悶。面上瘡赤。口乾舌裂。咽喉澁痛。消中引飮。或傷寒時變。口鼻出血。煩燥者。及風毒下疰。瘡腫疼痛。脚氣衝心。悶亂。一切風熱毒氣。並皆主之。

生大黃五兩。　山梔子仁十兩。　生杏仁二兩。去皮尖。

右三味。煉蜜爲圓。每服三十圓至五十圓。夜臥溫湯吞下。利下赤毒膠涎爲效。服時隨意加減。此爲甚穩善不損臟腑。常服搜風順氣解毒。治小兒驚熱。以蜜湯化下三五圓。極效。

淳祐新添方

【導赤散】治大人小兒心經內虛。邪熱相乘。煩躁悶亂。傳流下經。小便赤澁淋瀝。臍下滿痛。

生乾地黃　甘草生用。　木通各等分。

右㕮咀。每三錢。水一盞。竹葉少許。煎六分。溫服。不拘時。

吳直閣增諸家名方

【三黃圓】治丈夫婦人三焦積熱。上焦有熱。攻衝眼目赤腫。頭項腫痛。口舌生瘡。中焦有熱。心膈煩躁。不美飮食。下焦有熱。小便赤澁。大便秘結。五臟俱熱。卽生痔瘻瘡痍。及治五般痔疾。糞門腫痛。或下鮮血。

黃連去蘆鬚　黃芩去蘆　大黃煨各十兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每三十圓熱水下如臟腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之

【消毒犀角飲】治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風瘡瘴毒赤瘤及瘡瘍已出未出不能快透並皆治療小兒瘍痘欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

鼠粘子六十四兩　荊芥穗　甘草炙各十六兩　防風去苗八兩

右爲麤末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

續添諸局經驗祕方

【碧雪】治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嘔吐物妨悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憒並皆治之

寒水石研飛　芒硝　石膏煅研飛　青黛

馬牙硝　朴硝　消石　甘草各等分

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消鎔得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研爲末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能嚥物者用小竹筒吹藥入喉中頻用神效

【勝冰丹】治三焦壅盛。上衝頭目。赤熱疼痛。口舌生瘡。咽喉不利。嚥物有礙。神思昏悶。並皆治之。

白藥子一兩半。　山豆根　黃連　甘草炙。
黃藥子　紅內消各二兩。　麝香研。　龍腦研。各二錢。

右爲末。用建盡盛於飯上蒸。候冷。次入腦麝令勻。煉蜜圓如鷄頭大。每一圓含化。又用津唾於指甲上磨少許點赤眼。立效。

【導赤圓】治心腎凝滯。膀胱有熱。小便不通。風熱相搏。淋瀝不宣。或服補藥過多。水道壅澁。出少起數。臍腹急痛。攻痃陰間。或心肺壅熱。面赤心忪。口乾煩渴。及癰腫發背。血脈瘀閉。服此排膿內消。腫毒疏導心經邪熱。應內蘊風熱。五般淋疾。並皆治之。

山梔子仁炒。一十二兩。芍藥赤者。　茯苓去皮。各四兩。　生乾地黃焙。
木通去節。各半斤。　大黃炒。十五兩。　滑石四兩。

右爲細末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服二十圓至三十圓。食後溫熱水吞下。

【五淋散】治證與前五淋散同。

山梔仁炒。十四兩。　淡竹葉四兩。　芍藥赤者。　茯苓去皮。各半斤。
山茵陳去根。二兩　木通去節。　甘草炙。　滑石各六兩。

右爲末。每服三錢。水一盞。煎至八分。空心服。

【麥門冬散】治丈夫婦人蘊積邪熱。心胸煩悶。咽乾口燥。睡臥不安。或大小腸不利。口舌生瘡。並皆治之。

芒消一兩。　麥門冬去心三分。　小草　黃連去鬚。
升麻去蠶皮。　犀角屑　甘草炙。　黃芩
枳殼去穰。麩炒。　大青各半兩。

右爲末。每服三錢。水一盞。煎至七分。食後溫服。

【眞珠散】治丈夫婦人五臟積熱。毒氣上攻。心胸煩悶。口乾舌燥。精神恍惚。心忪悶亂。坐臥不寧。並宜服之。

眞珠粉　琥珀　寒水石火煆。醋淬　牙硝枯研。
瓜蔞根末　鐵粉　甘草末生用。　硃砂研飛。
川大黃

右等分。各爲末拌勻。每服一錢。以竹葉湯溫調下。

【靈液丹】治一切風熱。臟腑積熱。毒氣上攻。胸膈煩躁。口舌乾澀。心神壅悶。咽嗌不利。飲食無味。

寒水石火煆。研飛。　石膏研。　瓜蔞根　烏梅去核炒。
赤茯苓去木。　葛根各一兩。　麥門冬一兩半。　龍腦別研。一錢。

右將麥門冬去心訖。並爲末。入研藥令勻。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。薄綿裹。含化嚥津。

瀉痢　附祕澀

【鍾乳建脾圓】治男子婦人虛損羸瘦。身體沉重。脾胃冷弱。飲食不消。腹脹雷鳴。泄痢不止。又治腸虛積冷。下痢清穀。或下純白。腹中疼痛。及久痢赤白。腸滑不禁。少氣羸困。不思飲食。並宜服之。

鍾乳粉三兩。　當歸去蘆　龍骨　神麴碎炒。
赤石脂煅。　黃連去鬚　人參去蘆　細辛去苗土。
大麥蘗炒。　乾薑炮　茯苓去皮　石斛去根。
肉桂去麤皮。各二兩。　附子炮去皮臍一兩。　蜀椒去目及閉口者微炒出汗六兩。

右爲末。入鍾乳粉勻。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。溫米飲下。食前日三服。

【朝眞丹】治腸胃虛弱。內受風冷。或飲食生冷。內傷脾胃。泄瀉暴下。日夜無度。腸鳴腹痛。手足厥寒。

硫黃生研細三十兩。　白礬煅七兩半。　硃砂三兩一錢研爲衣。

右合研勻。用水浸蒸餅爲圓。如梧桐子大。以前硃砂爲衣。每服三十圓。溫米飲下。不計時候。夏月宜備急。

【駐車圓】治一切下痢。無問新久及冷熱膿血。腸滑裏急。日夜無度。臍腹絞痛。不可忍者。

黃連去鬚三十兩。　乾薑炮製十兩。　阿膠搗碎炒如珠子爲末。以醋四升煎成膏。
當歸十五兩。

右爲末。阿膠膏和併手圓。如梧桐子大。每服三十圓。食前溫米飲下。日三服。凡小兒服。圓如麻子大。量歲數加減。

【訶黎勒圓】治腸胃虛弱。內受風冷。水穀不化。泄瀉注下。腹痛腸鳴。胸滿短氣。又治腸胃積寒。久痢純白。或有青黑。日夜無度。及脾胃傷冷。暴瀉不止。手足厥冷。脈微欲絕。

肉豆蔻去皮。　木香不見火。　乾薑炮。各二十兩。　縮砂仁

訶黎勒皮　川烏頭炮。去皮臍。　白礬煨。各四十兩。　龍骨洗。

赤石脂各八十兩。

右爲末。用粟米飯爲圓。如梧桐子大。每服二十圓至三十圓。溫粟米飲下。食前。甚者可倍加圓數服。

【大溫脾圓】治脾胃虛弱。冷氣攻衝。飲食不化。心復脹痛。嘔吐吞酸。痞噎不通。腸鳴泄利。水穀不分。面黃肌瘦。食減嗜臥。常服溫肺脾胃。消穀進食。久虛痼冷。食少傷多。宜常服。

吳茱萸湯洗七次。　大麥蘗炒。　肉桂去麤皮。各五兩。　附子炮。去皮臍。

細辛去苗。各二兩。　枳殼麩炒。一分半。　神麴碎炒。三兩一錢。　人參去蘆。

乾薑炮。　甘草炙。　桔梗各三兩。

右爲細末。煉蜜和圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫酒或米飲下。日三服。空心食前。

【黃連阿膠圓】治腸胃氣虛。冷熱不調。下痢赤白。狀如魚腦。裏急後重。臍腹疼痛。口燥煩渴。小便不利。

阿膠碎炒一兩　茯苓去皮二兩　黃連去鬚三兩

右黃連茯苓同爲末水調阿膠末搜和圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下食前服

【神效胡粉圓】治腸胃虛滑下痢無度赤白相雜臍腹疼痛裏急後重減食羸瘦或經久未差並宜服之

烏賊魚骨洗　阿膠炒焦如珠子　胡粉各四十兩　蜜陀僧二十兩

白礬枯過

右爲末以粟米飯爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫粟米飲空心下

【桃花圓】治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂　乾薑炮各等分

右爲末水麵糊爲圓如梧桐子大每服三十圓溫米飲下空心食前日三服

【靈砂丹】治臟腑怯弱內有積滯臍腹撮痛下痢膿血日夜無度裏急後重腸鳴皰脹米穀不化少氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸瘦

桂府滑石　乳香研各一分　黃丹研　枯礬研各一兩半

信州砒霜　消石與砒霜一處研入磁罐子內用石灰蓋口炭火燒半日取出去火毒

臘粉研　粉霜研各半兩　硃砂研飛一兩

右爲末用蒸餅二兩四錢和爲圓如梧桐子大每服五圓溫粟米飲下未愈加圓數再服小兒可服

一圓至二圓隨大小臨時加減服之。

【不二圓】治大人小兒一切瀉痢。無問冷熱赤白。連綿不差。愈而復發。腹中疼痛者。宜服之。

白膠香研細四錢。　砒霜一兩六錢。研入磁罐子。以赤石脂固縫。鹽泥固濟。燒通赤。候冷取出。

木鼈子十箇。燒焦。　乳香六錢半。研。　黃丹二兩半。炒。　黃蠟一兩三錢。

硃砂研飛半兩。　巴豆去皮心膜出油。　杏仁去皮尖。各七十箇。研。

右研勻。鎔蠟和圓。如黃米大。每錢作一百二十圓。每服一圓。小兒半圓。水瀉。新汲水下。赤痢。甘草湯下。白痢。乾薑湯下。赤白痢。甘草乾薑湯下。並放冷。臨臥服。忌熱物一兩時辰。

【訶黎勒散】治脾胃虛弱。內挾冷氣。心脇臍腹、脹滿刺痛。嘔吐惡心。飲食減少。腸鳴泄利。水穀不化。怠惰少力。漸漸瘦弱。並宜服。

訶子皮　青皮去穰。各四十兩。　附子炮。去皮臍。十斤。　肉桂去麤皮。五斤。

肉豆蔻仁麵裹煨。令熟。四十兩。

右爲末。每服三錢。水盞半。生薑三片。煎七分。食前溫服。

【木香散】治脾胃虛弱。內挾風冷。泄瀉注下。水穀不化。臍下疼痛。腹中雷鳴。胸膈痞悶。脇肋虛脹。及積寒久利。腸滑不禁。肢體羸困。不進飲食。

肉豆蔻仁　當歸去蘆。　甘草炙。　木香

丁香各二十兩。　赤石脂　附子去皮臍。醋煮切片焙乾。各十兩。
訶子皮十五兩。　藿香葉洗焙。四十兩。

右爲末。每服一大錢。水一盞。生薑二片。棗一箇。同煎至六分。溫服。空心食前。

【神功圓】治三焦氣壅。心腹痞悶。六腑風熱。大便不通。腰腿疼痛。肩背重疼。頭昏面熱。口苦咽乾。心胸煩燥。睡臥不安。及治脚氣。幷素有風人大便結燥。

大麻仁別搗如膏。　人參去蘆。各二兩。　大黃錦紋者。麵裹煨。　訶黎勒皮。各四兩。

右爲末。入麻仁搗研勻。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫水下。溫酒米飲皆可。食後臨臥。如大便不通。可倍圓數。以利爲度。

【麻仁圓】順三焦。和五臟。潤腸胃。除風氣。治冷熱壅結。津液耗少。令人大便秘難。或閉塞不通。若年高氣弱及有風人大便秘澁。尤宜服之。

白檳榔半生半煨。　山茱萸　防風去蘆叉。　枳殼去穰。麩炒。
兔絲子酒浸。　車前子　肉桂去麤皮。　山藭各一兩半。
郁李仁去皮。別研　大黃半蒸半生。　麻仁別搗研。各四兩。　羌活去蘆。
木香各一兩。

右爲末。入研藥勻。煉蜜和圓。如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫水臨臥服。

【脾約麻仁圓】治腸胃燥澀。津液耗少。大便堅硬。或秘不通。臍腹脹滿。腰背拘急。及有風人大便結燥。又治小便利數。大便因硬而不渴者。謂之脾約。此藥主之。

厚朴去麤皮。薑汁炒。枳實麩炒。芍藥各半斤。大黃蒸焙。一斤。
麻仁別研。五兩。杏仁去皮尖炒研。五兩半。

右爲末。蜜和圓如梧桐子大。每服二十圓。臨臥溫水下。以大便通利爲度。未利再服。

【七聖圓】治風氣壅盛。痰熱結搏。頭目昏重。涕唾稠粘。心煩面赤。咽乾口燥。精神不爽。夜臥不安。肩背拘急。胸膈痞悶。腹脇腹滿重疼。大便秘結。小便赤澁。及嵐瘴之地。最宜服。

郁李仁去皮。大黃蒸焙。各一兩。肉桂去麤皮。羌活去蘆。
檳榔生。木香生。川芎各半兩。

右爲末。煉蜜溲和爲圓。如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫熟水下。食後臨臥服。更量臟腑虛實加減服。

【七宣圓】療風氣結聚。宿食不消。兼砂石。皮毛在腹中。及積年腰脚疼痛。冷如冰石。脚氣衝心。煩憒悶亂。頭旋暗倒。肩背重痛。心腹脹滿。胸膈閉塞。風毒腫氣。連及頭面。大便或秘。小便時澁。脾胃氣痞。不能飲食。脚轉筋。攣痛。急心神恍惚。眠臥不安等疾。

訶黎勒皮 柴胡去苗。洗。枳實麩炒。木香各五兩。

桃仁去皮尖爁六兩　大黃麵裹煨十五兩　甘草爁六兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓米飲下食後臨臥服稍增至四五十圓取宜利爲度覺病勢退服五補圓不問男女老少並宜服量虛實加減服

【七棗湯】治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹脇脹滿臍腹疼痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡心胃膈痞悶困倦少力不思飲食

茴香去土炒　川烏炮去皮臍　縮砂取仁各八兩　甘草六兩

乾薑炮四兩　厚朴去皮薑製　益智去皮各一斤

右爲麤末每服二錢水一盞大棗七箇擘破同煎七分去滓溫服食前空心

【胃風湯】治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服

白芍藥　白朮　肉桂去麤皮　人參去蘆

當歸　芎藭　茯苓去皮各等分

右爲麤末每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

【半硫圓】除積冷暖元臟溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子絞過　半夏湯洗七次焙乾爲末

右等分，以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下，圓如梧桐子大，每服空心溫酒或生薑湯下十五圓至二十圓，婦人醋湯下。

【赤石脂散】治腸胃虛弱，水穀不化，泄瀉注下，腹中雷鳴，及冷熱不調，下痢赤白，腸滑腹痛，遍數頻多，脇肋虛滿，胃腸痞悶，肢體困倦，飲食減少。

縮砂仁二十箇　赤石脂　甘草爁各五兩　肉豆蔻仁麵裹煨令熟四十兩

右爲末，每服二錢，溫粟米飲調下，食前空心服。

紹興續添方

【純陽眞人養臟湯】治大人小兒腸胃虛弱，冷熱不調，臟腑受塞，下痢赤白，或便膿血，有如魚腦，裏急後重，臍腹疼痛，日夜無度，胃腸痞悶，脇肋脹滿，全不思食，及治脫肛墜下，酒毒便血，誘藥不效者，並治之。

白芍藥一兩六兩　當歸去蘆　人參去蘆　白朮各六錢

肉豆蔻麵煨半兩　肉桂去蠹皮　甘草炙各八錢　木香一兩四錢

訶子皮一兩二錢　罌粟殼去蒂蓋蜜炙三兩六錢

左爲麤末，每服二大錢，水一盞半，煎八分，去滓，食前溫服，老人孕婦小兒暴瀉急宜服之，立愈，忌酒麵生冷魚腥油膩，如臟腑滑泄，夜起久不瘥者，可加炮了附子三四片煎服，此藥的有神效，不可具

述。

【感應圓】治證并方。見一切氣類。

【大已寒圓】治證并方。見傷寒類。

寶慶新添方

【御米湯】治久患痢疾。或赤或白。臍腹疼痛。裏急後墜。發歇無時。日夕無度。及下血不已。全不入食。並治之。

罌粟殼蜜炙。　白茯苓去皮。　甘草炙。各五兩。　人參去蘆。

乾薑炮。各二兩半。　厚朴去麤皮。薑製炒。十兩。

右㕮咀。每服三錢。水一盞半。生薑三片。大淮棗二枚。烏梅一箇。煎至一盞。去滓。空心食前通口服。如年老及七八十歲。每服二大錢。小兒每服一錢半。更量兒歲加減。

【地楡散】治腸胃氣虛。冷熱不調。泄瀉不止。或下鮮血。或如豆汁。或如豚肝。或膿血相雜。赤多白少。復痛後重。遍數頻併。全不入食。並宜服之。又方見後。

罌粟殼去穰蜜炙。　石榴皮　蓮蓬去蒂。　甘草炒。各兩等分。

右爲細末。每服二大錢。水一盞半。生薑三片。煎至一盞。通口服。不拘時候。

【金粟湯】治丈夫婦人室女小兒。一切下痢。無問新久。冷熱不調。日夜無度。臍腹絞痛。卽痢肢體困倦。小

便閉澁，不思飲食，漸加羸瘦，又治傷生冷，脾胃怯弱，飲食不消，腹脹雷鳴，泄瀉不止，連月不瘥，並宜服之。

罌粟殼去穰，蜜炒。　甘草炒，各半斤。　陳皮去白，一兩一分。　車前子四兩，炒。

乾薑二兩，炮。

右爲細末，每服二大錢，水一盞，棗一枚，生薑二片，煎至七分，空心食前稍熱服，或用飯飲調下亦得。忌生冷油膩魚腥鮓醬等物。

【育腸圓】治腸胃虛弱，內挾生冷，腹脹泄瀉，時時刺痛，裏急後重，下痢赤白，或變膿血，晝夜頻併，經久不瘥，

烏梅肉　黃連去鬚，梗，各一分。　當歸去蘆，酒浸透一宿，焙，一兩。

肉豆蔻濕紙裹煨。　訶子皮　罌粟殼去蓋筋，蜜炙，各半兩。

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心食前飯飲下，如小兒作小圓，煎甘草乾薑湯下。

【腸風黑散】治榮衛氣虛，風邪冷氣，進襲臟腑之內，或食生冷，或啖炙煿，或飲酒過度，積熱腸間，致使腸胃虛弱，糟粕不聚，大便鮮血，臍腹疼痛，裏急後重，或肛門脫出，或久患酒痢，大便頻併，並皆治之。

木饅頭燒。　敗棋燒。　烏梅去核。　甘草炙，各二兩。

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎至七分，空心溫服

【斗門散】治八種毒痢膿腑撮痛膿血赤白或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重大渴不止酒痢臟毒全不進食又方見後

罌粟殼去穰蜜炙　黑豆炒去殼各四兩　當歸去蘆　乾薑炮各一兩

地榆去蘆　甘草炙各二兩　乾葛去皮半斤

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不拘時候

【水煮木香圓】治一切赤白膿血相雜裏急後重或臟腑滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹疼痛可思飲食又方見後

青皮去白　甘草爁各二兩四錢　罌粟殼去穰二兩八錢　當歸去蘆

訶子炮去核　木香不見火各六兩

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓水八分盞煎至六分空心食前溫服

淳祐新添方

【大斷下圓】治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

高良薑去蘆　赤石脂研　乾薑炮

酸石榴皮去穰淨米醋浸一宿炙焦黃色　白礬枯

肉豆蔻麵裹煨　訶子煨去核

龍骨研各一兩半　附子炮去皮臍

牡蠣火煆各一兩　細辛去土葉七錢半

右爲細末。醋煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服五十圓。空心溫米飲下。

【狗頭骨圓】治久患下痢。臍腹疼痛。所下雜色。晝夜不止。或其人久虛。頻下腸垢。謂之惡痢。並能治之。

肉豆蔻麵裹煨。　附子炮去皮臍。　狗頭骨一具。火燒存性。取末。各一兩。

赤石脂　敗龜燒存性。　乾薑各半兩。

右爲末。醋糊圓如梧桐子大。每服五七十圓。米飲空心下

吳直閣增諸家名方

【水煮木香圓】治證與前水煮木香圓同。

白芍藥　當歸去蘆各二兩。　罌粟殼去蒂蓋蜜炒黃色。八兩。

陳橘皮去白。　青皮去白。　甘草炒。　木香各一兩一分。

訶子皮去核。二兩半。

右爲細末。煉蜜圓。每一兩作六圓。每服一圓。水一盞。煮至七分。和滓空心溫服。不拘時亦得。

【大香連圓】治丈夫婦人腸胃虛弱。冷熱不調。泄瀉煩渴。米穀不化。腹脹腸鳴。胃膈痞悶。脇肋脹滿。或下痢膿血。裏急後重。夜起頻併。可思飲食。或小便不利。肢體倦怠。漸即瘦弱。

木香四兩八錢八分。　黃連去蘆鬚二十兩。用吳茱萸十兩同炒令赤。去茱萸不用

右爲細末。醋糊爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。飯飲吞下。空心食前。日進三二服。

【戊己圓】治脾受濕氣。泄痢不止。米穀遲化。臍腹刺痛。小兒有疳氣下痢。亦能治之。

吳茱萸去梗炒　黃連去鬚。　白芍藥各五兩。

右爲細末。麵糊爲圓。如梧桐子大。每服二十圓。濃煎米飲下。空心日三服。

【痢聖散子】治丈夫婦人遠年日近赤白休息等痢。

黃柏皮去麤皮。　枳殼去穰。　甘草炙。　御米卽罌粟子。

罌粟殼去蒂蓋各四兩。乾薑炮。　當歸去蘆二兩。

右爲麤散。每服三錢。水一盞半。薤白二條。擘碎同煎八分。去滓。食前溫服。老人小兒加減服。食忌生冷油膩物。

【豆附圓】治丈夫婦人腸胃虛弱。內受風冷。水穀不化。泄瀉注下。腹痛腸鳴。手足厥冷。服諸藥不效者。此藥主之。

肉豆蔻炮。　附子炮去皮臍。　茯苓白者。焙。各四兩。　木香不見火。

肉桂去麤皮。　乾薑炮各二兩。　丁香一兩。不見火。

右爲細末。薑汁麵糊爲圓。如梧桐子大。每服五十圓至一百圓。生薑湯下。或粥飲亦得。空心食前進。

【溫中圓】治脾臟傷冷。宿食不消。霍亂吐瀉。心腹膨脹攻刺。

良薑去蘆。　乾薑炮。　青皮去白。　陳皮去白。各五兩。

右爲細末用醋打麵糊爲圓如梧桐子大每服三十圓米飲下不拘時候又療丈夫小腸疝氣塊疼痛炒茴香少許嚼鹽湯或鹽酒任下日進二服

【肉豆蔻散】治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消臟腑滑瀉腹內虛鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱

訶子皮　川烏炮去皮臍　肉桂去麤皮　茴香炒各二兩
肉豆蔻麵裹煨　厚朴去麤皮薑炒　甘草爐　乾薑炮
陳橘皮各四兩　蒼朮米泔浸一宿去皮焙八兩

右爲末每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分溫服

【神應黑玉丹】治丈夫婦人久新腸風痔瘻着床頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周圍多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效

刺蝟皮十六兩　猪懸蹄一百隻　雷丸　脂麻各四兩
牛角腮十二兩　苦楝根五兩　亂髮皂角水洗焙　敗棷各八兩
槐角六兩

右剉碎用瓷罐內燒存性研爲末入乳香二兩麝香八錢研和勻用酒打麵糊爲圓如梧桐子大每

服八粒。先細嚼胡桃一枚。以溫酒吞下。空心晚食前。日二服。如病甚。日三服。切忌別藥。不過三兩日。永除根本。

【罌粟湯】治腸胃氣虛。冷熱不調。或飲食生冷。內傷脾胃。或飲酒過度。臍腹疼痛。泄瀉腸鳴。下痢或赤或白。裏急後重。日夜頻併。飲食減少。及腸胃受濕。膨脹虛鳴。下如豆汁。或下鮮血。

罌粟殼去蒂蜜炙。四兩。艾葉去梗。　黑豆炒。去皮。　乾薑炮。

陳皮去白。　甘草炙。各二兩。

右爲麤散。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。溫服。食前。忌生冷油膩毒物。小兒量歲數加減與之。

【固腸散】治脾胃虛弱。內受寒氣。泄瀉注下。水穀不分。冷熱不調。下痢膿血。赤少白多。或如魚腦。腸滑腹痛。遍數頻併。心腹脹滿。食減少力。

陳米炒。二十兩。　肉豆蔻生用。罌粟殼去蒂蓋膜。蜜炙。各二兩。　乾薑炮。

甘草炙。各二兩半。　木香一兩。不見火。

右爲末。每服二錢。酒一盞。生薑二片。棗一枚。同煎至七分。溫服。不計時。如不飲酒。水煎亦得。忌酒麵魚腥等物。

【麵朮圓】治時暑暴瀉。壯脾溫胃。進美飲食。及療飲食所傷。胃膈痞悶。

神麯炒。　蒼朮米泔浸一宿。焙乾。

右各等分爲細末。麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。不拘時。米飲吞下。

【纏金丹】治大人小兒一切瀉痢。無問冷熱赤白。連綿不瘥。愈而復發。腹中疼痛者。宜服之。

白膠香一錢。　黃蠟　硃砂各一兩。　乳香　砒霜三錢半醋煮熯。

硇砂各二錢半。　木鼈半兩。　黃丹二兩半。

巴豆去皮心膜出油。　杏仁去皮尖又雙仁者各八兩。

右研爲末。鎔蠟和圓。如麻子仁大。每服一圓。小兒半圓。水瀉。新汲水下。赤痢。甘草湯下。白痢。乾薑湯。赤白痢。甘草乾薑湯。並放冷臨臥服。孕婦莫服。忌熱物一二時辰。

【縛虎圓】治休息痢經一二年不瘥。羸瘦衰弱及脾疼腰痛。

黃蠟半兩。　砒成塊好者半兩。研細。

右將黃蠟鎔開下砒。以柳條七箇。逐箇攪頭。焦卽換。候用足取起。旋圓如梧桐子大。每服一圓。痢。冷水下。脾疼亦然。腰痛。冷酒下。並食前。小兒圓如黍米大。每服一圓。湯使同上。

【遇仙立效散】治諸般惡痢。或赤或白。或濃淡相雜。裏急後重。臍腹絞痛。或下五色。或如魚腦。日夜無度。或禁口不食。不問大人小兒虛弱老人產婦。並宜服之。

御米殼去蒂蓋。炒。　川當歸去蘆。　甘草各二兩。　赤芍藥

酸榴皮　地榆各半兩。

右爲麤散。每服三錢。水一盞半。煎至七分。空心溫服。小兒量歲數加減。以瘥爲度。忌生冷油膩腥臊等物。

【三神圓】治清濁不分。泄瀉注下。或赤或白。臍腹疼痛。裏急後重。

草烏三枚。各去皮尖。一生。一炮。一燒作灰。

右爲細末。醋糊圓如蘿蔔子大。大人五七圓。小兒三圓。水瀉倒流水下。赤痢甘草湯下。白痢乾薑湯下。

續添諸局經驗祕方

【地榆散】治大人小兒脾胃氣虛。冷熱不調。下痢膿血。或因腸胃乘虛爲熱毒所滲。下痢純血。臍腹疼痛。裏急後重。口燥煩渴。小便不利。純下鮮血。或先經下痢。不應服熱藥而誤服熱藥。蘊毒不散。積於腸間。滲而成血者。並宜服之。

赤芍藥　茯苓去皮。各六兩。　地榆炒。　乾葛各半斤。

罌粟殼蜜炒。十二兩。　當歸去苗。三兩　甘草炙。四兩。　乾薑炮。二兩。

右爲細末。每服二錢。用溫熱水調下。不拘時候。小兒三歲可服半錢。更量歲數加減與之。若下痢純白。或下紫黑血腸滑不禁者。不可服之。

【祕傳斗門散】治八種毒痢。臟腑撮痛。膿血赤白。或下瘀血。或成片子。或有五色相雜。日夜頻併。兼治禁

口惡痢。裏急後重。久渴不止。全不進食。他藥不能治者。立見神效。

罌粟殼蜜炒。半斤。　地榆炒。　甘草炙。各六兩。　白芍藥三兩。

乾薑炮。四兩。　黑豆炒。去皮。十二兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。同煎至七分。溫服。

【丁香豆蔻散】治脾胃虛弱。宿寒停積。或飲食生冷。內傷脾胃。泄瀉注下。水穀不化。胃滿短氣。嘔逆惡心。臍腹疼痛。脇肋脹滿。腹內虛鳴。飲食減少。及積寒久痢純白、或白多赤少。日夜無度。或脾胃虛寒。泄瀉日久。愈而復發者。並宜服之。

京三稜炮。　白茯苓去皮。　木香不見火。　乾薑炮。

肉豆蔻炮。　厚朴去麤皮。薑汁製。　人參去蘆。　芍藥各五兩。

吳茱萸湯洗七次。　甘草炙。　丁香各一兩半。　蒼朮去皮。七兩。

右爲細末。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。同煎至八分。空心食前溫服。如不及煎。鹽少許湯點服亦得。

【萬金飲】治脾胃虛弱。內受風寒。或飲食生冷。傷於脾胃。嘔吐泄瀉。臍腹疼痛。脇肋脹滿。腸內虛鳴。及腸胃受濕。膿血相雜。下如豆汁。或下瘀血。裏急後重。日夜無度。飲食減少。漸至羸瘦。並能治之。

陳皮去白。　甘草半生半炙。　罌粟殼去蒂蓋。半生半蜜炙。各等分。

右爲麤末。每服四錢。先用沸湯泡盡熱。又於椀內盛重湯。坐盡在內。却抄藥末在盡內。用沸湯泡至七分。蓋上用盡蓋之。良久。紗綿濾去滓。空心食前溫服。

【如神止瀉圓】治臟腑虛寒。脾胃受濕。泄瀉無度。腸鳴腹痛。不進飲食。漸至羸瘦。並宜服之。

蒼朮米泔浸。去黑皮。焙。半夏湯洗七次。去滑。各半斤。　川烏米泔浸軟。去皮。切作片。焙乾。用鹽四兩同炒黃色爲度。去鹽不用。淨秤四兩。

右爲末。薑汁和圓。如梧桐子大。每服五十圓。空心飯飲下。

【神效參香散】治大人小兒臟氣虛怯。冷熱不調。積在臟腑。作成痢疾。或下鮮血。或如豆汁。或如魚腦。或下瘀血。或下紫黑血。或赤白相雜。或成五色。裏急後重。日夜頻併。臍腹絞痛。甚不可忍。及禁口痞蠱。時瘟諸痢。無新舊。並能治之。

肉豆蔻去皮。　茯苓去皮。各四兩。　人參去蘆。　木香

白扁豆炒。各二兩。　罌粟殼去蒂。　陳皮去白。各十二兩。

右爲末。每服三大錢。溫米飲調下。不拘時候。立見神效。

【黃耆湯】治年高老人大便祕澀。

綿黃耆　陳皮去白。各半兩。

右爲細末。每服三錢。用大麻仁一合。爛研。以水投取漿一盞。去滓。於銀石器內煎。候有乳起。卽入白

蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食煎服秘甚者不過兩服愈常服卽無秘澀之患此藥不冷不燥其效如神

增廣太平惠民和劑局方卷七

眼目

【錦鳩圓】治肝經不足，風邪內乘，上攻眼暗淚出，怕日羞明，隱澁痒痛，瞻視茫茫，多見黑花，或生翳膜，並皆治之。

甘菊花揀淨　黃連去鬚，各一兩　防風去蘆　細辛去苗，各半兩
杜蒺藜炒，去尖角　牡蠣火煅，取粉用　官桂去麤皮，各五兩　瞿麥
草決明　羌活去蘆，各三兩　薏仁去皮，各三兩　白茯苓去皮，四兩
蔓菁子二升，淘洗，絹袋盛，飯甑蒸一伏時，曬　班鳩一隻，去皮毛腸嘴爪，用文武火連骨炙乾
羯羊肝一具，薄批炙乾，令焦

右爲末，煉蜜和杵五百下，圓如梧桐子大，每服十五圓至二十圓，以溫水或溫酒下，空心，日午，臨臥，日三服。如久患內外障眼，服諸藥不效者，漸加服五十圓，必效。暴赤眼疼痛，食後用荊芥湯下二十圓。

【駐景圓】治肝腎俱虛，眼常昏暗，多見黑花，或生障翳，視物不明，迎風有淚，久服補肝腎，增目力。

熟乾地黃製　車前子各三兩　菟絲子酒浸別研八兩

右爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。溫酒下。空心晚食前日二服。

【蜜蒙花散】治風氣攻注兩眼昏暗。眵淚羞明。臉生風粟。隱澁難開。或癢或痛。漸生醫膜。視物不明。及久患頭疼。牽引兩眼。漸覺細小昏澁隱痛。并暴赤腫痛。並皆治之。

蜜蒙花揀淨　石決明微炒　羌活去蘆　菊花去土

杜蒺藜炒去尖　木賊各等分

右爲細末。每服一錢。臘茶清調下。食後日二服。

【羚羊角散】治大人小兒一切風熱毒上衝眼目。暴發赤腫。或生瘡疼痛。隱澁羞明。

羚羊角鎊　車前子　甘草微炙　黃芩

川升麻各十兩　決明子二十兩炒　草龍膽去蘆　山梔取仁各五兩

右爲細末。每服一錢。食後溫熟水調下。日進三服。小兒可服半錢。

【秦皮散】治大人小兒風毒赤眼。腫痛癢澁。眵淚昏暗羞明。

滑石桂府者搗碎　黃連去鬚　秦皮各十兩

右爲細末。每用半錢。沸湯泡去滓。溫熱頻洗。

【鎮肝圓】治肝經不足。內受風熱。上攻眼目。昏暗癢痛。隱澁難開。推眵多淚。怕日羞明。時發腫赤。或生障翳。並宜服之。

決明子炒　地膚子　遠志去心　防風去蘆及叉
蔓荆子去白皮　菟蔚子　茯苓白者去皮　人參去蘆各一兩
青箱子　柏子仁炒　元參　甘草炙
車前子　地骨皮　山藥　柴胡去蘆
甘菊花各半兩

右爲細末蜜水煮湖爲圓如梧桐子大每服二十圓用米飲下食後日二服

【菊睛圓】治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足强目力

甘菊花四兩　巴戟去心一兩　蔥蓉酒浸去皮炒切焙二兩
枸杞子三兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫酒或鹽湯下空心食前服

紹興續添方

【菩薩散】治男子婦人風氣攻注兩目昏暗眵淚羞明臉皆眶痒或時赤痛耳鳴頭眩

白蒺藜炒　防風剉炒　蒼朮米泔浸一宿去皮剉炒各二兩
荆芥穗一兩半　甘草炙一兩

右爲末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下一大錢神效

【撥雲散】治男子婦人風毒上攻眼目昏暗。瞖膜遮障。怕日羞明。眼多熱淚。隱澁難開。眶痒赤痛。臉皆紅爛。瘀肉侵睛。但是一切風毒眼疾。並皆治之。

羌活　防風　甘草炒。　柴胡各一斤。

右爲細末。每服二錢。水一中盞。煎至七分。食後臨睡時服。薄荷茶調菊花苗湯下亦得。忌醃藏鮓醬濕麵。及炙煿發風毒等物。

寶慶新增方

【草龍膽散】治上焦受於風熱。氣毒攻衝眼目。暴赤躁澁羞明。腫痛多眵。迎風有淚。瞖膜攀睛。胬肉隱痛。並治之。又方見後。

龍膽草洗去土。　菊花去梗。　木賊洗去節。　草決明子微炒。

甘草炙各二兩。　香附子炒去毛。　川芎不見火各四兩。

右爲細末。每服二錢。用麥門冬熟水入砂糖少許同調。食後服。或米泔調。或食後臨睡服。

【蟬花散】治肝經蘊熱。風毒之氣內搏。上攻眼目。瞖膜遮睛。赤腫疼痛。昏暗視物不明。隱澁難開。多生眵淚。內外障眼。

草決明炒。　甘菊花去梗。　川芎不見火。　蟬退洗去土。

山梔子去殼。　穀精草去土。　防風不見火。　黃芩去土。

蔓荆子去皮。　木賊草洗淨。　羌活不見火。　荆芥去梗。
蜜蒙花去枝。　白蒺藜炒去土。　甘草各等分。

右爲末每服二錢用茶清調服或用荆芥湯入茶少許調服亦得食後及臨臥時服。

淳祐新添方

【春雪膏】治肝經不足內受風熱上攻頭目昏暗瘡痛隱澁難開昏眩赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花。

腦子二錢半研。　薏仁去皮殼壓去油二兩。

右用生蜜六錢將腦子薏仁同和每用銅筯或金銀釵股大小臂時復少許茲之治連眶赤爛以油紙塗藥貼。

吳直閣增諸家名方

【流氣飲】治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤腫隱澁難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應有眼疾並宜服之。

牛蒡子炒。　荆芥去梗。　木賊去蘆。　細辛去苗。
白蒺藜去尖炒。　元參去蘆。　菊花去枝。　大黃炮。
蔓荆子去白皮。　黃芩去蘆。　甘草炙。　防風去蘆。

山梔子去皮。　川芎各一兩。　草決明一兩半。　蒼朮二兩。米泔浸洗。

右爲細末。每服二錢半。臨臥用冷酒調下。如牙兒有患。只令乳母服之。

【洗肝散】治風毒上攻。暴作赤目。腫疾難開。隱澁眵淚。昏暗羞明。或生醫膜。

山梔取仁。　川芎　防風去蘆。　薄荷去梗。

當歸去蘆。　大黃　羌活去蘆。　甘草炙。各二兩。

右爲末。每服二錢。冷水或熟水調下。食後日三服見效。

【菊花散】理肝氣風毒。眼目赤腫。昏暗羞明。癢澁難開。攀睛瞼肉。或痒或痛。漸生醫膜。及治暴赤腫痛。

白蒺藜炒。去尖。　蟬退去頭足翅。　羌活去蘆不見火。　木賊草去根節。各三兩。

菊花去梗。六兩

右爲細末。每服二錢。食後臨臥茶清調下。常服明利頭目。洗肝去風。忌發風醃藏炙爆等物。

【明睛散】能治外障。退醫膜。療風毒上攻。眼疼赤腫。或臉皆痒爛。時多熱淚昏澁。

赤芍藥　當歸去蘆。洗。　黃連去鬚。　滑石細研。各五兩

右爲細末。入研滑石拌勻。每用半錢。沸湯點澄清去滓。熱洗。忌一切醃藏魚酢酒麵等毒物。

續添諸局經驗祕方

【蟬花無比散】治大人小兒遠年近日一切風眼、氣眼、攻注。眼目昏暗。臉生風粟。或痛或痒。漸生醫膜。侵

睛遮障。視物不明。及久患偏正頭風。牽搐兩眼。漸漸細小。連眶赤爛。及小兒瘡疹入眼。白膜遮睛。赤澁隱痛。常服祛風退翳明目。

石決明用鹽同東流水煮一伏時。濾出研細。　當歸洗焙。　川芎
羌活各三兩。　蛇脫微炙。一兩。　防風去叉枝。　茯苓去皮。
甘草各四兩。　蔦蓂炒。去刺。半斤。　蟬退去頭足翅。二兩。　芍藥赤者。十三兩。
蒼朮浸。去皮炒。十二兩。

右爲細末。每服三錢。食後米泔調服。菜清亦得。忌食發風毒等物。

【明眼地黃圓】治男子女人肝臟積熱。肝虛目暗。膜入水輪。漏睛眵淚。眼見黑花。視物不明。混睛冷淚。翳膜遮障。及腎臟虛憊。肝受虛熱。及遠年日近暴熱赤眼。風毒氣眼。並治之。兼治乾濕腳氣。消中消渴。及諸風氣等疾。由腎氣虛敗者。但服此能補肝益腎。驅風明目。神效。

牛膝去蘆。酒浸。三兩。　生乾地黃　熟乾地黃各洗焙。一斤。　石斛去苗。
防風去蘆叉。　枳殼去穰。麩炒。各四兩。　杏仁去皮尖。麩炒黃。細研。去油。二兩

右爲細末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。空心食前溫酒下。或飯飲鹽湯亦得。忌一切動風毒等物。

【洗眼紫金膏】治遠年日近。翳膜遮障。攀睛胬肉。昏暗淚多。瞻視不明。或風氣攻注。臉生風粟。或連眶赤

爛。怕日羞明。隱澁難開。並治之。

硃砂　鵬砂　乳香各別研。　赤芍藥

當歸去苗洗各一分。　雄黃研飛二錢。　麝香別研半錢。　黃連去鬚半兩。

右爲末。入研藥拌勻。再擂煉蜜溲和爲圓。如皂莢子大。每次用一圓。安淨盞內。以沸湯泡開。於無風處洗。藥冷。閉目少時。候三兩時再煨令熱。依前洗。一貼可洗三五次。不得犯銅鐵器內洗。如暴赤眼腫者。不可洗之。

【草龍膽散】治眼暴赤腫痛。風氣熱上衝。睛疼連眶。臉皆赤爛。瘀肉侵睛。時多熱淚。及因叫怒逆損肝氣。久勞瞻視。役損眼力。風砂塵土入眼澁痛。致成內外障翳。及一切眼疾。

草龍膽去苗。　蔓荊子去刺各六兩。　茯苓去皮四兩。　菊花去枝半兩。

赤芍藥半斤。　防風去叉。　甘草炙。　羌活各三兩。

右爲末。每服二錢。食後臨臥時溫酒調下。

【湯泡散】治肝經不足。受客熱風壅上攻。眼目赤澁。睛疼臉爛。怕日羞明。夜臥多淚。時行暴赤。兩太陽穴疼。頭旋昏眩。視物不明。漸生翳膜。並皆治之。

赤芍藥　當歸洗焙。　黃連去鬚各等分。

右爲末。每用二錢。極滾湯泡。乘熱熏洗。冷卽再溫洗。一日三五次洗。以瘥爲度。忌醃藏等物。

【還睛圓】治男子女人風毒上攻。睛目赤腫。怕日羞明。多饒眵淚。隱澀難開。眶痒赤痛。臉皆紅爛。瘀肉侵睛。或患暴赤眼睛疼不可忍者。併服立效。

白朮生用。　兔絲子酒浸別研。　白蒺藜炒去刺。　木賊去節。
羌活去苗。　青箱子去生。　蜜蒙花　防風去蘆。
甘草炙各等分。

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。空心食前日三服。又治偏正頭痛。頭風目眩運。

【曾青散】治一切風熱毒氣上攻。兩眼多生眵淚。怕日羞明。隱澀難開。眶爛赤腫。或痒或痛。及時行暴赤眼睛昏澀痛。

曾青四兩。　蔓荊子去皮二兩。　防風去蘆　白薑炮各一兩。

右爲細末。每用少許末搐入鼻中。立有功效。

【秘傳羊肝圓】治丈夫婦人肝經不足。風毒上攻。眼目昏暗。淚出羞明怕日。隱澀難開。或痒或痛。又治遠年日近內外醫眼攀睛翳肉。箴刮不能治者。此藥治之。

黃連去鬚爲末。　白羊子肝淨洗去膜。

右將羊肝先入沙盆內杵爛之。旋入黃連末拌擂。乾濕得所。爲圓如梧桐子大。每服十四圓。食後以溫漿水下。連作五劑瘥。但是諸般眼疾及障翳青盲者。皆主之。禁食猪肉及冷水。〇治目方。用黃連

者多矣。此方最爲奇異。劉禹錫云。有崔承元者。因官治一死罪囚而活出之。囚後數年以病目致死。一旦崔忽爲內障所苦。喪明。踰年後。半夜歎息獨坐。時聞階除間悉窣之聲。崔問爲誰。曰。是昔所蒙活囚。今故報恩至此。遂以此方告訖而沒。崔依此方合服。不數月。眼復明。因傳于世。

咽喉口齒

【龍石散】治大人小兒上膈壅毒。口舌生瘡。咽嗌腫塞。疼痛妨悶。每用少許糝貼患處。嚥津。小兒瘡疹毒氣攻口齒。先用五福化毒丹掃後。仍再用此藥糝貼立效。

生腦子研二錢半。　硃砂研飛。二兩半。　寒水石燒通赤。二斤。

右爲末。每日三五次用。夜臥糝貼妙

【如聖湯】治風熱毒氣上攻。咽喉咽痛。喉痹腫塞。妨悶。及肺壅咳嗽。咯唾膿血。胃滿振寒。咽乾不渴。時出濁沫。氣息腥臭。久久吐膿狀如米粥。又治傷寒咽痛。

苦桔梗一兩。　甘草炒。二兩。

右爲麤末。每服二錢。水一盞。煎至七分。去滓溫服。小兒時時呷服。食後臨臥。

【鵬砂圓】治大人小兒風壅膈熱。咽喉腫痛。舌頰生瘡。口乾煩渴。

腦子研。三分。　甘草浸汁熬膏。　鵬砂研。各十兩。　梅花腦別研。一分。

麝香研。一兩。　牙硝枯研。二兩。　寒水石燒通赤。五十兩。

右爲末。用甘草膏子和溲。每兩作四百圓。每服一圓。含化嚥津。常服化痰利膈。生津止渴。

【麝臍散】治牙齒搖動。風虫疼痛。斷肉宣露。涎血臭氣。常用令牙齒堅牢。解骨槽毒氣。

郁李仁二十兩。　木律四十四兩。　麝香空皮子一百箇。細剉。黃芩二十箇。細切。

牛膝去蘆十斤。

已上五味。搗碎入罐子內。上用瓦子蓋口。留一小竅。用鹽泥固濟。燒令通赤。候烟白色。卽住火取出。以新土罨一伏時。取出後。入下項藥。

細辛去苗。　升麻各十斤。

右爲細末。每用少許揩患處。須臾溫水漱口。臨臥更貼少許。嚥津亦不妨。

紹興續添方

【玉屑無憂散】治咽喉腫痛。舌頰生瘡。風毒壅塞。熱盛喉閉。或因誤吞硬物。諸骨鯁刺。涎滿氣急。或至悶亂不省人事。

白茯苓炒黃色。　元參去蘆。　貫衆去蘆。　甘草

山豆根揀去梗。　黃連去鬚。　縮砂去殼。　滑石

荊芥穗各一兩。　鵬砂二錢。　寒水石二兩。研。水飛。

右爲末。每服一錢。乾縮舌上後。以新水嚥下。不拘時。

寶慶新增方

【如聖勝金鋌】治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾結喉重舌木舌腮頷腫痛屢經用藥不能吞水粥者又方見後

生地黃　川芎洗　硫黃研　消石研

薄荷葉　川烏炮　臘茶各二兩

右爲細末裂生葱自然汁溲和爲鋌每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷五七葉微爛用藥一鋌同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服卽愈重舌腮腫先服一鋌次以一鋌安患處其病隨藥便消又治冒暑伏熱不省人事用生薄荷水調研一鋌灌下卽甦如行路常含一鋌卽無伏熱之患口舌生瘡不能合口并食熱物如上法服訖用水灌漱嚼薄荷十葉如泥吐出再水灌漱嚼藥一鋌含口內聚涎咽之覺涎滿方吐出如此服三鋌便能食酒醋遇食鹹酸鮓脯炙煿喉中生泡須摘破吐血方省薄荷數葉以一鋌同嚼井水吞下炒淋熱淋小便出血同車前草七葉生薑小塊研爛水調去滓嚼藥一鋌以水送下此藥分陰陽去風熱化血爲涎爲水常帶隨身備急一鋌可活一人命小兒只服半鋌

淳祐新添方

【鵬砂散】治大人小兒卒患喉痹閉塞不通腫痛生瘡語聲不快風壅痰毒鼻衄出血

鵬砂生。　甘草各二十兩。　山藥六斤。生。　腦子七兩。研。
麝香四兩。研。　牙硝二十四兩。生。

右爲細末。每服半錢。如茶點服。

吳直閣增諸家名方

【赴筵散】治風牙蛀牙。攻疰疼痛。晝夜不止。痛不可忍。睡臥不安。牙斷宣露。動搖欲脫。或腮頷浮腫。斷爛血出。

良薑去蘆。　草烏去皮。　荆芥去梗。　細辛去土葉。各二兩。

右爲末。每用少許於痛處擦之。有涎吐出。不得吞嚥。良久。用溫鹽湯灌漱。其痛卽止。常使揩牙。用腐炭末一半相和。常用。止牙宣辟口氣。永無牙疾。

【吹喉散】治三焦大熱。口舌生瘡。咽喉腫塞。神思昏悶。

蒲黃一兩。　盆硝八兩。　青黛一兩半。

右件用生薄荷汁一升。將盆硝青黛蒲黃一處。用瓷罐盛。慢火熬令乾。研細。每用一字或半錢。縿于口內。良久涎出。吞之不妨。或喉中腫痛。用筒子入藥半錢許。用力吹之。無不立效。

續添諸局經驗祕方

【如聖勝金鋌】治證服餌與前如聖勝金鋌同。品味小異。

朴硝四兩。　硫黃一兩半。　川芎一兩。　荊芥穗
薄荷用葉。　嫩茶各半兩。　貫衆二兩。

右爲末。裂生葱自然汁澆和爲餅。服藥湯使一如前方。

【五香散】治咽喉腫痛。諸惡氣結塞不通。急宜服之。

鷄舌香　木香　沉香　薰陸香各一兩。
麝香別研。三分。

右爲末。入麝香研令勻。每服二錢。水一中盞。煎至六分。溫服。不拘時候。

【如神散】治風牙蛀牙。攻痓疼痛。日夜不止。睡臥不安。或牙斷動搖。連頰浮腫。不拘久近。並皆治之。

露蜂房微炙。　川椒去目及閉口者。微炒出汗。

右爲末。每服一錢。水一盞。入鹽小許。同煎八分。乘熱漱之。冷卽吐出。一服立效。

【玉池散】治風蛀牙疼。腫痒動搖。牙齦潰爛。宜露出血口氣等疾。

當歸去蘆。　甘草炙。　川芎　防風
白芷　槐花炒。　藁本　地骨皮
細辛去苗。　升麻各等分。

右爲末。每用少許揩牙。痛甚卽取二錢。水一盞半。黑豆半合。生薑三片。煎至一盞。稍溫漱口。候冷吐

之。

【荆芥湯】治風熱肺壅。咽喉腫痛。語聲不出。或如有硬鯁物。

荆芥穗半兩。　甘草炙一兩。　桔梗二兩。

右爲麤末。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分。食後溫服。

【細辛散】治風蚛牙疼。或牙齦宣爛。牙齒搖動。腮頷浮腫。

紅椒　縮砂去殼。　鶴虱　牙皂

葦撥各半兩。　荆芥去梗。　細辛去苗。各一兩。　白芷

草烏各二兩。

右爲細末。每用少許於痛處擦之。有涎吐出。不得嚥。少時。用溫水漱口。頻頻擦之。立有神效。

增廣太平惠民和劑局方卷八

雜病

【耆婆萬病圓】療七種癖塊。五種癲病。十種痓忤。七種成尸。十二種蠱毒。五種黃病。十二時瘧疾。十種水病。八種大風。十二種瘕痹。幷風入頭眼暗漠漠。及上氣咳嗽。喉中如水雞聲。不得臥。飲食不作。肌膚五臟滯氣積聚。不消。壅閉不通。心腹脹滿。連及胸背。鼓脹氣。堅結流入四肢。或腹叉心膈氣滿。時定時發。十年二十年不瘥。五種下痢。疳蟲蚘蟲。寸白蟲。諸蟲上下。冷熱。久積痰飲。令人多眠睡。消瘦無力。蔭入骨髓。便成滯疾。身體氣腫。飲食嘔逆。腰脚酸疼。四肢沉重。不能久行久立。婦人因產冷入子臟。臟中不淨。或閉塞不通。胞中瘀血冷滯。出流不盡。時時疼痛。爲患。或因此斷產。幷小兒赤白下痢。及狐臭、耳聾、鼻塞等病。服此以三圓爲一劑。服不過三劑。萬病悉除。說無窮盡。故稱萬病圓。

牛黃研細。　黃芩　芫花醋炒赤。　禹餘糧醋淬研飛。
蒲黃微炒。　芎藭　人參去蘆。　紫苑去蘆頭。
雄黃研飛。　麝香研。　當歸去蘆。　桔梗去蘆。
大戟剉炒。　乾薑炮。　防風去蘆。　黃連去鬚。
硃砂研飛。　犀角鎊。　前胡去蘆。　巴豆去皮心膜炒。

細辛去苗。　蓽撥炒。　肉桂去麤皮。　桑白皮剉炒。
茯苓去皮。　芍藥　川椒去目及閉口者，微炒出汗。
甘遂各一兩。　芫青二十八枚，入糯米同炒，米色黃黑，去頭足翅。
蜈蚣十二節，去頭足，炙。　石蜥蜴去頭尾足，炙，一寸。

右爲細末，入研藥勻，煉蜜爲圓，如小豆大，若一歲已下小兒有疾者，令乳母服兩小豆，血出以吐利爲度，近病及卒病，用多服，積久疾病，即便服，常服微漉利爲度，卒病欲死，服三圓，取吐利即瘥，卒中惡口噤，服二圓，漿一合，下利即瘥，五痓鬼刺客忤，服二圓，男女邪病歌哭，腹大如妊身，服二圓，日三夜一間食，服之，蠱毒吐血，腹痛如刺，服二圓，不瘥更服，癰病未發前，服一圓，未瘥更服，諸有痰飲者，服三圓，冷癖，服三圓，日三服，皆間食，常令微漉利，宿食不消，服二圓，取利瘕癥積聚，服二圓，日三服，拘急心腹脹滿，心痛，服三圓，上氣嘔逆，胷滿不得臥，服二圓，不差更服，大痢，服二圓，日三服，疳濕，服二圓，以一圓如杏仁大，和醋二合，灌下，部中水病，服三圓，日再服，間食服之，瘥止，人弱，即隔日服，頭痛惡寒，服二圓，覆取汗，傷寒天行，服二圓，日三服，間食服之，小便不通，服二圓，不瘥，明日更服，大便不通，服三圓，又內一圓下部中，即通，耳聾脇耳，以綿裹如棗核塞之，鼻齆，服二圓，癰腫丁腫，破腫，內一圓如麻子大，日一傳之，根亦白出，犯丁腫血出，以猪脂和塗，有孔內孔中，瘘瘕瘡，以酢泔洗訖，取藥和猪脂傳之，漏瘡有孔，以一圓內孔中，和猪脂傳上，痔瘡，塗絡筋上，內孔中，日別易，瘥止，瘰癧以

醋和塗上。痿癬痛。以布揩令汁出。以醋和塗上。日一易。痿止。臂背腰脇腫。以醋和傅腫上。日一易。又服二圓。諸冷瘡積年不痊。以醋和塗之。惡刺。以一圓內瘡孔中。卽痊。蝮蛇螫。以少許內螫處。若毒入腹心煩欲絕者。服三圓。蜂螫。以少許傅之。痊。婦人諸疾。胞衣不下。服二圓。小兒驚癇。服一圓。如米許。以塗乳令嗍之。看兒大小加減。小兒客忤。服一圓。如米。和乳塗乳頭。令嗍之。以意量之。蝎螫。以少許傅之。痊。小兒乳不消。心腹脹滿。服一圓。如米許。塗乳頭。令嗍之。卽痊。

【神應圓】治腎經不足。風冷乘之。腰痛如折。引背膂俛仰不利。轉側亦難。或因役用過多。勞傷於腎。或因寢冷濕地。氣傷腰。或因墜墮傷損。或因風寒客搏。皆令腰痛。並皆治之。

肉桂去麁皮。　當歸去蘆。各十兩。　威靈仙去土。二十兩。

右爲末。以酒煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服十五圓。溫酒或煎茴香湯下。食前服。婦人煎桂心湯下。加至二十圓。有孕婦人不得服。忌食茗。

【集效圓】治因臟腑虛弱。或多食甘肥。致蛔蟲動作。心腹攪痛。發作腫聚。往來上下。痛有休止。腹中煩熱。口吐涎沫。卽是蛔咬。宜服此藥。若積年不差。服之亦愈。又療下部有蟲。生痔痒痛。

木香不見火。　鶴虱　附子炮。去皮臍。　訶黎勒煨。用皮肉。

蘗黃炒。研。　檳榔　乾薑炮。各七兩半。　大黃剉。擘炒。十五兩。

右爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。食前橘皮湯下。婦人醋湯下。

【乳香圓】治諸痔下血。肛邊生肉。或結核腫疼。或生瘡痒痛。或大便艱難。肛腸風下。又治腸風下血。無問新久及諸瘘根在臟腑。並能治之。

芫青去頭足翅。同糯米炒。以米色黃爲度。　枳殼去穰。麩炒。　大黃蒸。

蓽澄茄　牡蠣火煆。　鶴虱炒。各半兩。　乳香研。

白丁香一分。

右爲末。以粟米糊爲圓。如梧桐子大。每服十圓至十五圓。如治腸風臟毒清下。諸痔。煎雞白湯下。諸瘡煎鐵屑湯下。並食前服。

【解毒雄黃圓】解毒。治纏喉風及急喉痹。卒然倒仆。失音不語。或牙關緊急。不省人事。

雄黃碎飛。　鬱金各一分。　巴豆去皮。出油。十四箇。

右爲末。醋煮麵糊爲圓。如菉豆大。用熱茶清下七圓。吐出頑涎。立便蘇省。未吐。再服。如至死者。心頭猶熱。灌藥不下。卽以刀尺鐵匙幹開口灌之。藥下喉嚨。無有不活。吐瀉些小無妨。及治上隔壅熱。痰涎不利。咽喉腫痛。赤眼癰腫。一切毒熱。並宜服之。如小兒患喉嚨赤腫。及驚熱痰涎壅塞。服二圓或三圓。量兒大小加減。

【尅效餅子】治一切瘧病。發作有時。先覺伸欠。乃作寒慄。鼓振頤頷。中外皆寒。腰脊俱痛。寒戰既已。內外皆熱。頭痛如破。渴欲飲冷。或痰聚胸中。煩滿欲嘔。或先熱後寒。或先寒後熱。或寒多熱少。或熱多寒少。或

寒熱相半。或但熱不寒。或但寒不熱。或一日一發。或隔日一發。或一發後六七日再發。並皆主之。

龍腦　麝香　定粉各研半兩。　荷葉爐。

棊豆末　甘草爐各五兩。　硃砂一兩一分研飛。　信砒醋煮二兩半。

金箔二十五片爲衣。

右爲末。煉蜜溲和。每兩作二十丸。揑扁。以金箔爲衣。每服一餅子。以新汲水磨化。日發者。未發前服之。間日者。不發夜服。隔數日發者。前一日夜服。連日者臨晨服。

【烏梅圓】臟寒蛔蟲動作。上入膈中。煩悶嘔吐。時發時止。得食卽嘔。常自吐蛔。有此證。謂之蛔厥。此藥主之。又治久痢。

烏梅三百枚。　乾薑十兩。炮。　黃連去鬚。十六兩。　細辛去苗。

附子炮。去皮臍。　肉桂去麤皮。　人參去蘆。　黃蘗炙。各六兩。

當歸去蘆。　蜀椒去目及閉口者。微炒出汗。四兩。

右異搗篩。合治之。以醋浸烏梅一宿。去核。蒸之五斗米下。飯熟。搗成泥。和藥令相得。內臼中。與煉蜜杵一千下。圓如梧桐子大。每服十五圓。溫米飲下。食前服。

【神效散】雷名霹靂散。治十種水氣。面目四肢、遍身俱腫。以手按之。隨手而起。咳澁喘急。不得安臥。腹大腫脹。口苦舌乾。小便赤澁。大便不利。

葶藶炒香別研三兩　椒目一兩半　黑牽牛微炒二兩半　猪苓去黑皮
澤瀉各二兩

右爲細末每服以葱白三莖槳水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面向東服如人行十里久以槳水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升許不得喫鹽并麵自早至午當利小便三四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之後必須大將息及斷鹽房室等三年

【立效散】治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

瞿麥穗一兩　甘草三分　山梔子去皮炒半兩

右爲末每服五錢至七錢水一椀入蓮鬚葱白七莖燈心五十莖生薑五七片同煎至七分時時溫服不拘時

【必勝散】治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

人參去蘆　蒲黃微炒　小薊并根用　熟乾地黃
當歸去蘆　烏梅去核　芎藭各一兩

右爲粗散每服五錢水一盞半煎七分溫服不拘時候

【釣腸圓】治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

天南星生　白礬枯　綠礬枯　訶子煨去核

白附子生用。　附子生去皮臍。　枳殼去穰，麩炒。　半夏生，各二兩。

雞冠花微炒，五兩。　栝樓二枚存性。　蝟皮兩個，剉碎，礶內燒，存性。

右爲末，以醋煮麵糊圓，如梧桐子大，每服二十丸，空心臨臥溫酒下。遠年不瘥者，服十日見效。久服永除根本，小可腸風等疾，一二年內者，十服瘥，永不發動。

【石韋散】治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝不宣，出少起數，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁或使出砂石，並皆治之。

木通剉。　石韋去毛，各二兩。　滑石　白朮

瞿麥　芎藭　葵子各三兩。　當歸去蘆。

甘草炙。　王不留行各一兩。

右爲細末，每服二錢，小麥湯調下，食前日二三服。

【牡蠣散】治諸虛不足，及新病暴虛，津液不固，體常自汗，夜臥即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心忪驚惕，短氣煩倦。

麻黃根淨洗。　黃芪去苗土。　牡蠣米泔浸，刷去土，火燒通赤，各一兩。

右爲麤散，每服三錢，水一盞半，小麥百餘粒，同煎至八分，去滓，熱服，日二服，不拘時候。

【法製熟艾】主灸百病。

陳久黃艾不拘多少擇取葉入臼內用木杵輕搗令熱以細篩隔去青滓再搗再篩如此三次別以馬尾羅子隔之更再搗羅候柔細黃熟爲度

右主灸百病世人著灸多無法度徒忍痛楚罕能愈疾今於聖惠千金外臺等方內撫取點穴分寸作炷大小壯數多少等分如前

定分寸法取病人男左女右中指第二節內度兩橫紋相去爲一寸應取穴及作炷分寸並依此法

點灸穴法凡點穴時須得身體平直四肢毋令拳縮坐點毋令俯仰立點毋令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒肌肉虛忍痛楚若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴

作艾炷法即下火點灸須令艾炷根下廣三分長亦三分若減此不覆孔穴不中經脈火氣不行亦不能除病強壯人亦可稍增令大周歲已內小兒可如小麥大

點火法古來用火灸病忌八般木火今即不用木火灸又不犯諸患兼去久病以清油點燈燈上燒艾莖點灸兼滋潤灸瘡至愈已來且無疼痛用蠟燭更佳又火珠耀日以艾承之遂得火出此火灸病爲良次有火照耀日以艾引之便得火出此火亦佳

下火灸時法皆以日正午以後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不着午前平旦穀氣虛令人顛眩不可臥灸慎之慎之其大法如此卒急者不可用此例若遇陰霧大起風雪忽降猛雨炎暑雷電虹霓暫時且停候待清明即再下火灸灸時不得傷飽太飢飲酒食生硬物兼忌思慮憂愁怒呼罵叫

吁嗟歎息。一切不祥。忌之大吉。

治灸瘡不發法 凡着灸療病。歷春夏秋冬不較者。灸炷雖然數足。得瘡發膿。所患卽瘥。如不得瘡發膿出。其瘡不愈。甲乙經云。灸瘡不發者。用故履底灸令熱熨之。三日卽發膿出。自然愈疾。今用赤皮葱三五莖。去其葱青。於湯灰火中煨熱。拍破。熱熨灸瘡十餘遍。其瘡三日自發。立壞膿出疾愈。

淋洗灸瘡法 凡着灸治病。纔住火。便用赤皮葱薄荷二味煎湯。溫溫淋洗灸瘡。週迴約一二寸已來。身驅逐風氣於瘡口內出。兼令經脈往來不滯於瘡下。自然瘡壞疾愈。若灸瘡退火痂後。用桃樹東南枝梢青嫩桃皮二味等分。煎湯溫溫淋洗灸瘡。此二味偏能護灸瘡中諸風。若瘡內黑爛清者。加胡荽三味等分。煎湯淋洗。立有神效。

壯數多少法 千金方云。凡言壯數者。若丁壯遇疾病根深篤者。可倍多於方數。其人老小幼弱者。可復減半。依扁鵲灸法。有至五百壯千壯者。皆臨時消息之。

推人神所在法 一日足大指。二日外踝。三日股內。四日腰。五日口舌懸雍。六日足小指。七日內踝。八日足腕。九日尻。十日背膕。十一日鼻柱。十二日髮際。十三日牙齒。十四日胃脘。十五日遍身。十六日胃乳。十七日氣衝。十八日腹內。十九日足趺。二十日膝下。二十一日手小指。二十二日伏兔。二十三日肝俞。二十四日手陽明。二十五日足陽明。二十六日手足。二十七日膝。二十八日陰。二十九日膝脛。

三十日關元下至足已上人神所在之日禁忌着灸若遇病急切不拘此例

紹興續添方

【常山飲】治瘧疾凡瘧疾蓋因外邪客於風府生冷之物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發寒則肢體顫掉熱則舉身如燒頭痛惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾脊膂酸疼腸鳴腹痛諸藥不治漸成勞瘧者此藥治之

烏梅去仁一斤　知母　川常山　良薑二十兩　甘草炙　草菓各二斤

右爲粗散每服三錢水一盞生薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服

【對金飲子】治證并方並見傷寒類

【清心蓮子飲】治證并方並見痼冷類

寶慶新增方

【槐角圓】治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面腐肉如奶名舉痔頭上有孔名瘻並皆治之

槐角去枝梗炒一兩　枳殼去穰麩炒　黃芩各半斤　當歸酒浸一宿焙　防風去蘆　地榆各八兩

右爲末。酒湖圓如梧桐子大。每服三十圓。米飲下。不拘時候。此藥治腸風。瘡內有蟲。裏急下膿。血止痒痛。消腫聚。驅濕毒。久服永除病源。

淳祐新添方

【腸風黑散】治證與瀉痢類腸風黑散同。

荆芥二兩燒。　亂髮　槐花　槐角各燒一兩。

甘草炙。　蝟皮各一兩半　枳殼去穰二兩燒一兩炒。

右將合燒藥同入磁瓶內。黃泥固濟。燒存三分性。出火毒。同甘草枳殼搗羅爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。空心溫服。或溫酒調服亦得。

【神應黑玉丹】治證幷方見瀉痢類。

吳直閣增諸家名方

【備急圓】療心腹諸卒暴百病。中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如刀所刺。氣急口噤。

乾薑炮一兩。　巴豆去皮油。　大黃各二兩。

右件爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。每服三圓。溫水下。不拘時。

【青解毒圓】治大人小兒。五臟積熱。毒氣上攻。胸膈煩悶。咽喉腫痛。赤眼癰腫。頭面發熱。唇口乾燥。兩頰生瘡。精神恍惚。心忪悶亂。坐臥不寧。及傷暑毒。面赤身熱。心躁煩渴。飲食不下。

寒水石研。　石膏研。各二十六兩。　青黛八兩。

右件細研如粉。入青黛和勻。蒸餅七箇。水調爲圓。如雞頭大。每服一圓。食後新汲水化下。或細嚼用生薑水下亦得。如中諸毒。並宜服之。及小兒驚風潮熱。痰涎壅塞。心胃煩躁。頰赤多渴。睡臥不穩。每三歲兒可服半粒。更量歲數加減與之。

【寸金圓】治元陽虛弱。寒氣攻衝。膀胱小腸發腫作痛。或在心脇。牽連小腹。連屬陰間。致身體增寒。撮痛。

當歸去蘆。酒浸一宿。一兩半。　楮實子一兩半。　川楝子燒一兩半。

巴豆炒。七箇。　全蝎炒。四十箇。

右爲細末。用浸當歸酒打麵糊和圓。如雞頭實大。空心溫酒鹽湯吞下二圓至三圓。併進二服。

【奪命丹】治遠年日近小腸疝氣。偏墜搐疼。臍下撮痛。以致悶亂。及外腎腫硬。日漸滋長。陰間濕痒抓成瘡。

吳茱萸去枝梗。一斤四兩。用酒浸四兩。用醋浸四兩。用湯浸四兩。用童子小便浸。各浸一宿同焙乾。

澤瀉去灰土。二兩。

右爲細末。酒煮麵糊圓。如梧桐子大。每服五十圓。空心食前鹽湯或酒吞下。

續添諸局經驗祕方

【茱萸內消圓】治腎經虛弱。膀胱爲邪氣所搏。結成寒疝。陰癩偏大。上攻臍腹病痛。膚囊腫脹。或生瘡瘍。

時出黃水。腰腿沈重。足脛腫滿。行步艱辛。服之內消。不動臟腑。一方無枳實。陳皮。桃仁。延胡索。川楝子。木香。

山茱萸搗去核。取肉微炒。　桔梗水浸一伏時。漉出。慢火炒乾爲度。

白蒺藜炒。去刺。　川烏炮。去皮臍。　肉桂去粗皮。　食茱萸

吳茱萸微炒。　茴香舶上者。淘去沙石焙炒。　青皮去白。各二兩

海藻洗焙。　五味子淨揀。　大腹皮酒洗焙。　延胡索各二兩半。

枳實去穰。麩炒。　桃仁去皮尖及雙仁。麩炒別研。　陳皮去白。各一兩。

川楝子剉炒。三兩。　木香一兩半。

右爲末。酒糊圓如梧桐子大。溫酒下三十圓。食前服。

【麝香大戟圓】治陰癩腫脹。或小腸氣痛。

胡蘆巴炒。四兩。　大戟去皮炒黃。半兩。　麝香別研。一錢

川楝子各六兩。　檳榔刮去底。細切。不見火。　茴香舶上者。

訶子炮。去核。酒浸蒸。焙乾用。　木香各一兩。　附子炮。去皮臍。

右爲末。獨留川楝子。以好酒一二升。葱白七枝。長三四寸。煮川楝子軟。去核取肉。和藥搗杵。圓如梧桐子大。空心溫酒下五七圓至十圓。薑湯亦得。潮發疼痛。炒薑熱酒下十五圓。

【三白散】治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利。

白牽牛二兩。　桑白皮微炒。　白朮　木通去節。

陳皮去白各半兩。

右搗爲細末。每服二錢。薑湯調下。空心服。未覺。再進。常服導利留滯。不損臟氣。

【胡蘆巴圓】治大人小兒小腸氣。蟯腸氣。奔豚氣。疝氣。偏墜陰腫。小腹如卵。上下痛不可忍。或紋結遶臍攻刺。嘔惡悶亂。並治之。

胡蘆巴炒。一斤。　吳茱萸湯洗七次。炒。十兩。　川楝子炒。一斤二兩。

大巴戟去心。炒。　川烏炮。去皮。各六兩。　茴香去土。炒。十二兩。

右爲細末。酒煮麵糊爲圓。如梧桐子大。每服十五圓。空心溫酒吞下。小兒五圓。茴香湯下。

治瘡腫傷折

【雲母膏】治一切瘡腫傷折等病。

蜀椒去目及閉口者。微炒出汗。　白芷　沒藥研。

赤芍藥　肉桂去粗皮。　當歸　鹽花研

麒麟竭研。　白芨　芎藭

草龍膽　木香　白斂　防風去蘆叉。

厚朴去麤皮薑汁製。麝香研。　桔梗　柴胡去蘆頭。
松脂　人參　蒼朮泔浸一宿。　黃芩
夜合用皮。　乳香　附子去皮臍。　茯苓去皮。
高良薑各半兩。　消石研如粉。　甘草各四兩。　桑白皮
水銀候膏凝如人體熱。以生絹袋盛水銀。以手彈如針頭大。鋪在膏上。謂之養藥母。
柏葉不近道者。　槐枝　柳枝各二兩。　陳皮一兩。
雲母光明白薄白研粉四兩。　清油四十兩。　黃丹細研。十四兩。
黃芪去蘆半兩。

右除雲母。消石。麒麟竭。沒藥。麝香。乳香。黃丹。鹽花八味別研外。並剉如豆大。用上好清油。於瓷器中浸所剉藥七日。以物封閉後。用文火煎。不住手攪。三上火。三下火。每上候匝匝沸。乃下火。候沸定。再上。如此三次。候白芷附子之類黃色爲度。勿令焦黑。以綿或新布絞去滓。却入鐺中。再上火熬。後下黃丹與別研藥八味。以柳篦不住手攪。直至膏凝。良久色變再上熬。仍滴少許水中。凝結不粘手爲度。先炙一瓷器熱。即傾藥在內。候如人體溫熱。彈水銀在上。每用膏藥。即先刮去水銀。治發背。先以敗蒲一斤。用水三升。煎五十沸。如人體溫。將蒲水洗瘡拭乾。貼藥。一兩分爲三服。溫酒下。未成膿者。立瘥。於外貼之。妳癰外貼。瀼癰骨疽毒穿至骨。用藥一兩分作三服。溫酒下。甚者。即瀉出惡物。兼外

貼瘥。腸癰以藥半兩。分爲五服。甘草湯下。未成膿者。當時消。已有膿者。隨藥下膿。出後。每日酒下五圓如梧桐子大。待膿止卽住服。風眼。貼兩太陽穴。壁鏡咬。蜘蛛咬。外貼留瘡口。發腦。發髭鬢。發眉。發耳。膂癰。牙癰。牙疼。並外貼包裹。卽當時痛止。箭頭所傷。箭頭在內。外貼每日吃少許。爛豉。箭頭自出。虎豹所傷。先以甘草湯洗。然後貼膏。每日換。不過三次。貼狗蛇咬。生油下十圓如梧桐子大。仍須貼外。難產三日不分娩。溫酒下一分便生。血暈欲死。以薑汁和小便半升。溫酒下十圓。死者卽返。死胎在腹。以榆白皮湯下半兩便生。丈夫本臟氣。茴香溫酒下一分。每日一服。下過二服瘥。中毒。藥酒洗穢。溫下一分。每日一服。不過四度。瀉出惡物。瘥。瘤贅。外貼消之。一切腫癰。外貼立瘥。但有所苦。並皆貼之。藥到卽瘥。已上主療。只忌羊血。餘無所忌。如入收此藥防身。以蠟紙裹。不令風乾。可三十年不損藥力。

【小犀角圓】治腸癰乳癰發背。一初毒腫。服之化爲水。

巴豆二十二枚。去皮膜心。炒出油。細研。　大黃蒸焙。一兩一分。　犀角三兩。
黃連去鬚。　梔子去皮。　乾蓼藍　升麻
黃芩　防風去蘆。　人參　當歸去蘆。
黃芪去苗。　甘草炙。各一兩。

右爲細末。入巴豆勻。煉蜜溲和爲圓。如梧桐子大。每服三圓。溫湯下。利三兩行。喫冷粥止之。不利。加至

四五圓。初服取快。利後。漸減圓數。取微溏泄爲度。老小以意加減。腫消及和潤乃止。利下黃水。覺腫處微皺色變。卽是消候。一切腫毒皆內消。神驗不可論。忌熱麵蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷粘食。

【何首烏散】治脾肺風毒攻衝。遍身癬疥瘙痒。或生癮疹。搔之成瘡。肩背拘倦。肌肉頑痹。手足皴裂。風氣上攻。頭面生瘡。及治紫癜白癜頑麻等風。

荆芥穗　蔓荆子去白皮。　蚵坡草去土。　威靈仙淨洗。
何首烏　防風去蘆叉。　甘草炙。

右件各五斤。搗羅爲末。每服一錢。食後溫酒調下。沸湯亦得。

【大嶽活血丹】治男子婦人外傷內損。狗咬虫傷。驢撲馬墜。手足傷折。一切疼痛。腹中瘀血。刺脇築心。及左癱右緩。走痓疼痛。癰腫痔漏。婦人冷氣入腹。血脈不通。產後敗血灌注四肢。吹妳腫痛。血氣撮痛。並宜服之。

亂髮皁角水淨洗二斤。瀝乾。用清麻油二斤。入鍋內炒。頻以手撚。看脆亂如糊答卽止。不可令炒過。
栗楔謂栗三顆共一球。其中匾薄者是。去殼薄切日乾。
皂角刺燒通紅。米醋內淬焙　大黑豆以濕布拭去塵垢。退黑皮。焙乾。
花桑枝如臂大者。炭火燒烟盡。米醋淬。取出焙。各一斤　革麻仁別研。塗墨。三兩。
乳香好者。細研。入米醋一碗。煞令香熱。四兩。　硇砂光淨者。醋化塗墨上。二兩。

細墨半斤。一半用革麻仁三兩。乳鉢爛研。塗墨上。塗盡用薄紙裹以黃泥固濟。日乾。以火五七斤煅令通紅。放地上。盆蓋出火氣。兩飯久。一半用硇砂二兩。醋化塗墨上炙乾。

右六味爲末。入乳香膏內和杵三千下。圓如彈子大。如乳香膏少。更入醋煮麵糊。痛甚者。每服一圓。輕可者。服半圓。用無灰酒一盞。乳香一豆大。先磨香盡。次磨藥盡。煎三五沸。臨臥溫服。以痛處就床臥。如欲出汗。以衣被蓋覆。仍用藥塗磨損處。忌一切動風物。應婦人諸疾。服者更用當歸末一錢。依法煎服。有孕者莫服。

【玉龍膏】摩風止痛。消腫化毒。治一切傷折瘡腫。

梔婁大者一箇。去皮。　黃蠟一兩半。　白芷淨揀剉。半兩。　麻油清眞者。六兩。
麝香研。一錢。　松脂研。一錢半。　零香　藿香各一兩。
杏仁去皮尖。　升麻　黃芪　赤芍藥
白芨　白斂　甘草淨揀剉。各一分。

右以油浸七日。却濾出油。先煉令香熟。放冷。入諸藥。慢火煎黃色。用絹濾去滓。入銀石鍋內。入蠟并麝香松脂。熬少時。以瓷合器盛。每用少許。薄攤絹帛上貼。若頭面風癬痒瘡腫疼痛。並塗磨令熱。類頻用之。如耳鼻中肉鈴。用紙撚子每日點之。至一月卽愈。如治灸瘡及小兒瘤瘡。塗之兼滅瘢痕。神效。

【化毒排膿內補十宣散】亦名托裏十補散。治一切癰疽瘡癤。未成者速散。已成者速潰。敗膿自出。無用手擠。惡肉自去。不犯刀仗。服藥後疼痛頓減。其效如神。

黃芪以綿上來者爲勝。半如箭鏃長二三尺。頭不叉者。洗淨。寸截。搥破絲擘。以鹽湯潤透。用蓋盛。蓋湯鍋上。炊久焙燥。隨衆藥入研成細末。　人參以新羅者。擇團結重實滋潤者。洗淨去蘆薄切焙乾。　川當歸溫水洗。薄切焙乾。各二兩。　厚朴梓間者。去粗皮切。薑汁炙一宿。爐熟焙燥。　桔梗以有心味苦者爲眞。洗淨去頭尾。薄切焙燥。　桂心用卷薄者。別研。不見火。　芎藭以川中來者爲上。今多用撫芎大塊者。淨洗切焙。　甘草生用。　川白芷各一兩。　防風擇新香者。淨洗切焙。一兩。

右十味。選藥貴精。皆取淨晒焙極燥方秤。除桂心外。一處搗羅爲細末。入桂令勻。每服自三錢加至五六錢。熟酒調下。日夜各數服。以多爲妙。服至瘡口合。更服尤佳。所以補前損。杜後患也。不飲酒人。濃煎木香湯下。然不若酒力之勝也。或飲酒不多。能勉強開用酒調。并以木香湯解酒。功效當不減於酒也。大抵癰疽之作。皆血氣凝滯。風毒壅結所致。治之不早。則外壞肌肉。內攻臟腑。其害甚大。纔覺便服。倍加服數。服之醉。則其效尤速。發散風毒。流行經絡。排膿止痛。生肌長肉。藥性平和。老人。小兒。婦女。室女。皆可服之。

【沒藥降聖丹】治打撲閃肭。筋斷骨折。攣急疼痛。不能屈伸。及榮衛虛弱。外受遊風。內傷經絡。筋骨緩縱。皮肉刺痛。肩背拘急。身體倦怠。四肢少力。

自然銅火煅醋淬十二次。研爲末。水飛過焙。　川烏頭生。去皮臍。　骨碎補爐。去毛。

白芍藥　沒藥別研。　乳香別研。　當歸洗焙。各一兩。

生乾地黃　川芎各一兩。

右並生用爲細末。以生薑自然汁與蜜等分。煉熟和圓。每一兩作四圓。每服一圓。搥碎水酒各半盞。入蘇木少許。同煎至八分。去蘇木。熱服。空心食前。

寶慶新增方

【千金漏蘆湯】治癰疽發背。丹毒惡腫。時行熱毒發作。赤色瘰癧。初發頭目赤痛。暴生障翳。吹妳腫痛。一切無名惡瘡。雖覺所苦細微。不可輕慢。急服此藥。並皆內消。更不成膿。若發背癰疽已成膿者。當排日服之。直至膿盡。

漏蘆去蘆。　麻黃去根節。　升麻剉。　赤芍藥生。剉。

黃芩去皮。　甘草生。剉。　白斂淨洗。　白芨去鬚。

枳殼米泔浸一宿。去白。各四兩。

右㕮咀。每服四錢。水二盞煎至一盞。紗帛濾去滓。空心食前熱服。以快利爲度。病人更自量增損服

【滑肌散】治風邪客於肌中。渾身瘙痒。致生瘡疥。及脾肺風毒攻衝。徧身瘡疥。皺裂乾濕。發瘡日久不瘥。並皆治之。

翦草七兩。不見火。　輕粉一錢。

右爲細末。瘡濕用藥乾。慘瘡乾用麻油調藥傳之。

【神效托裏散】治癰疽發背。腸癰妳癰。無名腫毒。焮作疼痛。增寒壯熱。類若傷寒。不問老幼虛人。並皆治之。

忍冬草去梗。　黃芪去蘆。各五兩。　當歸一兩二錢。　甘草炙。八錢。

右爲細末。每服二錢。酒一盞半。煎至一盞。若病在上。食後服。病在下。食前服。少頃。再進第二服。留滓外傳。未成膿者。內消。已成膿者。卽潰。

淳祐新添方

【紅玉散】斂瘡口。生肌肉。止疼痛。去惡水。不問日近年深。並治之。

寒水石炭火燒通赤。候冷細研。二兩。　黃丹半兩。

右同研細。乾慘瘡口內。後用萬金膏貼之。每日一上。或再上。尤妙。

【萬金膏】治癰疽發背。諸瘡癤。從高墜墮。打撲傷損。脚膝生瘡。遠年臁瘡。五般痔漏。一切惡瘡。並皆治之。

龍骨　鼈甲　苦參　烏賊魚骨
黃蘗　草烏頭　黃連　猪牙皂角
黃芩　白斂　白芨　木鼈子仁
當歸洗焙　厚朴去粗皮　川芎　香白芷
沒藥別研　槐枝　柳枝並同剉研各一分
乳香別研一錢　黃丹一兩半　清麻油四兩冬月用半斤

右除黃丹外銀石器中將諸藥於油內慢火煎紫赤色去藥不用却入黃丹一半放油內不住手攪令微黑更入餘黃丹不住手攪須是慢火熬令紫黑滴在水上不散及不粘手然後更別入黃丹少許再熬數沸如硬時却更入油些小以不粘手爲度用時量瘡大小攤紙上貼之

吳直閣增諸家名方

【接骨散】治從高墜下馬逐傷折筋斷骨碎痛不可忍接骨續筋止痛活血

定粉　當歸各一錢　鵬砂一錢半

右爲細末每服二錢煎蘇木湯調下服訖後時時吃蘇木湯

【急風散】治久新諸瘡破傷中風項强背直腰爲反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中沸聲

丹砂一兩　草烏頭三兩一半生用一半以火燒存性於米醋內淬令冷

麝香研。　生烏豆同草烏一處爲末。各一分。

右爲細末。和勻。破傷風。以酒一小盞調半錢。神效。如箭頭。先用酒一盞調服半錢。却以藥貼箭瘡上。

【油調立效散】治濕疥侵淫。流潰遍體。大作瘡漿。搔之水出。小如粟粒。痒痛難任。肌膚濕潤。經久不差。

膩粉　綠礬　黃蘗微炙。細研。　硫黃研細各等分。

右爲細末研勻。以生油調藥塗之。

【導滯散】治重物壓迮。或從高墜下。作熱五內。吐血下血。出不禁止。或瘀血在內。胸腹脹滿。喘麤氣短。

當歸　大黃

右等分。炒爲末。每二錢。溫酒調下。不計時候。

【拔毒散】治小兒丹毒。肉色變異。或着四肢。或在胸背。遊走不定。煩熱疼痛。拔毒消腫。散熱定疼。

石膏三兩。　甘草　黃蘗各一兩。　寒水石七兩。

右爲細末。每用水調時。復以雞翎刷掃。以芭蕉自然汁調藥妙。

【琥珀膏】治頸項瘰癧及發腋下。初如梅子。腫結硬強。漸若連珠。不消不潰。或穿穴膿潰。肌汁不絕。經久難差。漸成瘻疾。並治之。

琥珀一兩。　木通　桂心　當歸

白芷　防風　松脂　硃砂研。

木鼈去殼各半兩　麻油二斤　丁香　木香各三分

右件藥先用珬珀丁香桂心硃砂木香五味搗羅爲末其餘藥並細剉以油浸一宿於鑊中以慢火煎候白芷焦黃漉出次下松脂末濾去滓再澄清油却安鑊中慢火熬下黃丹一斤以柳木篦不住手攪令黑色滴入水中成珠子不散看硬軟得所入珬珀等末攪令勻於瓷器內盛之每使時看大小用火炙紙上勻攤貼之

【丹參膏】治乳腫乳癰毒氣煩作赤熱漸成攻刺疼痛及治乳核結硬不消散通順經絡宣導壅滯

丹參　赤芍藥　白芷各等分

右細剉以酒淹三宿入猪脂半斤微煎令白芷黃色濾去滓入黃蠟一兩每用少許時時塗之

【神效當歸膏】治湯火傷初起瘡漿熱毒侵展煩赤疼痛毒氣壅盛腐化成膿斂瘡口生肌肉拔熱毒止疼痛

當歸　黃蠟各一兩　麻油四兩

右件先將油煎令當歸焦黑去滓次入蠟急攪之放冷入瓷合內每使時以故帛子攤貼

【烏蛇膏】治風邪毒氣外客皮膚薰發成腫所起不定遊走往來時發痒痛或風毒勢盛攻注成瘡煩赤多膿瘡邊緊急但是風腫並皆治之

吳茱萸　葉本　獨活　細辛

白殭蠶去絲嘴炒。　半夏　漢椒去目炒。　防風
赤芍藥　當歸　桂心　川芎
香白芷各半兩。　烏蛇　黃蠟各二兩。　乾蝎
附子去皮尖。各一兩。

右件細剉。以煉臘月猪脂二斤文火煎。候白芷赤黑色爲度。綿濾去滓。下蠟入瓷器內盛。每用取少許。磨之令熱。日三服。

【神仙太一膏】治八發癰疽。一切惡瘡軟癩。不問年月深遠。已成膿。未成膿。貼之卽效。蛇、虎蝎、犬、湯火、刀斧所傷。並可內服外貼。發背先以溫水洗瘡拭乾。用帛子攤藥貼。仍用水下。血氣、木通酒下。赤白帶下。當歸酒下。咳嗽喉閉纏喉風。並緜裹含化。一切風赤眼。貼太陽穴後。用山梔子湯下。打撲傷損。貼藥仍用橘皮湯下。腰膝痛貼之。鹽湯下。墜血、桑白皮湯下。諸漏、先以鹽湯洗其諸瘡癩。並量大小。以紙攤藥貼之。並每服一粒。旋圓櫻桃大。以蛤粉爲衣。其藥可收十年不壞。愈久愈烈。神效不可具述。

元參　白芷　川當歸去蘆　肉桂去麤皮。
大黃　赤芍藥　生乾地黃各一兩。

右剉。用麻油二斤浸。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。濾去滓。油熬得所。次下黃丹一斤。以滴油在水中不散爲度。

續添諸局經驗祕方

【補損當歸散】療墜馬落車被打。傷腕折臂。呼叫不絕。服此藥。呼吸之間不復大痛。服三日。筋骨卽當相連。神效。忌冷水。

澤蘭製。　附子炮。去皮。各一分。　當歸炒。　蜀椒炒。去汗。

甘草炙。　桂心各三分。　芎藭炒。六分。

左爲細末。每服二錢。溫酒調下。日三服。忌海藻。菘菜。葱。猪。

【排膿托裏散】治一切瘡癰癰毒及腸癰。或赤腫而未破。或已破而膿血不散。渾身發熱。疼痛不可堪忍者。幷治婦人妳癰。一切毒腫。並宜服之。

地蜈蚣　赤芍藥　當歸　甘草各等分。

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。不拘時候。

【升麻和氣飮】治瘡疥發於四肢臂髀。痛痒不常。甚至增寒發熱。攻刺疼痛。浸淫浮腫。又癩風入臟。陰下濕痒。耳鳴眼痛。皆治之。

乾薑　熟枳殼各半錢。　乾葛　熟蒼朮

桔梗　升麻各一兩。　當歸　熟半夏

茯苓　白芷各二錢。　陳皮　甘草各一兩半。

芍藥七錢半。　大黃蒸半兩。

右爲剉散每服四大錢水一盞半薑三片燈心十五莖煎至七分去滓食前服。

【五香連翹湯】治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病。出三因方。

沈香不見火。　舶上青木香　乳香不見火。

甘草生各一兩。　連翹去蒂。　射干　升麻

桑寄生如無以升麻代之。　獨活今鋪家所賣者只是宿前胡或是生當歸不堪用只用羌活甚妙。　木通去節各三分。　丁香不見火半兩。　大黃蒸三兩。

麝香眞者別研一錢半。

右㕮咀每服四大錢水二盞煮取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服半日以上未利再吃一服以利下惡物爲度未生肉前服不妨以折去熱毒之氣【本方】有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故闕之智者當自添減。

【五香連翹湯】方甚多當以三因爲正李氏方併存之。○【李氏】用乳香甘草木香沈香連翹射干升麻木通桑寄生獨活各三分丁香半兩大便祕者加大黃三分李氏所以不用大黃者蓋恐虛人老人不宜服故臨時加減耳。

【又一方】青木香三分桑寄生二分沈香木通生黃芪大黃各一兩酒浸煨麝香二錢乳香麝香川升

麻、連翹、各半兩、雞舌香三分、此方與三因李氏方同、但多加雞舌香、藿香耳、

增廣太平惠民和劑局方卷九

治婦人諸疾外有治療諸方互見各類。

【熟乾地黃圓】治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澀不能温潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能尅消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒久不成胎月水不調乍多乍少或月前月後或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色陰中冷痛時發腫痒月水將行臍腹先痛皮膚皺澀癮疹瘙痒麻痹筋攣面生黡黯髮黃脫落目淚自出心忪目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏色枯黑飲食無味漸成蓐勞並皆療之。

熟乾地黃酒浸。　五味子揀淨。　柏子仁微炒別研。　芎藭各一兩半。

澤蘭去梗二兩一分。　禹餘糧火燒紅醋淬七遍細研。　防風去蘆叉。

肉蓯蓉酒浸一宿。　白茯苓去皮。　厚朴去粗皮薑汁炙。　白芷

乾薑炮。　山藥　細辛去苗。　卷柏去根各一兩。

當歸去蘆酒浸炒。　藁本去蘆洗。　甘草炙各一兩三分。　蛇床子揀淨微炒。

牛膝去苗酒浸一宿。　人參　續斷　蕪荑炒。

蜀椒去目及閉口者微炒出汗。　杜仲去粗皮炙黃。　艾葉炒各三分。

赤石脂煆醋淬　石膏煆研飛各二兩　肉桂去粗皮　石斛去根

白木各一兩一分　紫石英煆醋淬研飛各三兩

右件藥搗羅爲末煉蜜和搗五七百杵圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒婦女不宜服之

【澤蘭圓】治產後勞傷腑臟虛羸未復氣血不調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜臥飲食不進產後百日內每日常服壯氣益血暖下臟進飲食

黃芪　澤蘭去梗　牛膝去苗酒浸一宿　人參去蘆

赤石脂煆各一兩　附子炮去皮臍　木香　草薢

白茯苓去皮　續斷各三分　肉桂去粗皮　芎藭

白朮　乾薑炮　當歸去蘆剉微炒　甘草炙微赤各半兩

熟乾地黃淨洗酒蒸焙一兩半

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每三十圓溫米飲下空心食前

【人參荊芥散】治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心怔煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疙痛痃癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍

臥甚卽着床。

荆芥穗　羚羊角鎊。　酸棗仁微炒。　生乾地黃

枳殼麩炒去穰秤。　人參　鼈甲醋浸去裙炙黃。　肉桂去粗皮。

白朮　柴胡各七兩半。　甘草剉炙。　芎藭

赤芍藥　牡丹皮　當歸　防風去苗叉各五兩

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓熱服不拘時日二服常服除一切風虛勞冷宿病有孕不宜服。

【牡丹煎圓】治婦人衝任本虛少腹挾寒或因產勞損子臟風寒搏於血氣結生瘕聚塊硬發歇臍腹刺痛脇肋緊脹腰膝疼重拘攣腫滿背項强急手足麻痺或月水不調或瘀滯澁閉或崩漏帶下少腹冷疼寒熱盜汗四肢酸痛面色痿黃多生黯黶羸乏少力心多驚悸不欲飲食。

延胡索　縮砂仁各半兩。　赤芍藥　牡丹皮各一兩。

山茱萸　乾薑炮各半半兩。　龍骨細研水飛。　檳榔

熟乾地黃酒浸。　羌活各二兩。　蕤本去土。　五味子

人參　白芷　當歸去蘆酒浸。　乾山藥

澤瀉　續斷細者。　肉桂去粗皮。　白茯苓

白朮　附子去皮臍。牛膝去苗酒浸一宿焙。

木香　菖蒲炮爲末炒熱各一兩。石斛去根酒浸三兩。

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫酒或醋湯下空心食前日二服婦孺不宜服。

【熟乾地黃散】治婦人勞傷血氣腑臟虛損風冷邪氣乘虛客搏肢體煩痛頭目昏重心多驚悸密熱盜汗羸瘦少力飲食不進。

丹參去蘆頭。防風去蘆叉。當歸去蘆微。細辛去苗。

藁本去蘆洗。芎藭各半兩。人參

白茯苓去皮。肉桂去粗皮。熟地黃酒洒蒸焙各一兩。

續斷　附子炮去皮臍。黃芪去蘆各三分。

右爲麤散每服四錢水一盞半入生薑半分棗三枚擘破煎至一盞濾去滓食前溫服。

【安息活血丹】治衝任不足下焦久寒臍腹疼痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止面色痿黃肌肉瘦瘁肢體沉重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並宜服之。

吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒。　安息香搗碎入好酒研澄濾去滓銀器內慢火熬成膏。

柏子仁炒。　山茱萸去核。　延胡索　桃仁去皮尖麩炒微黃。

虎杖　當歸　杜仲去粗皮剉炒　附子炮去皮臍
木香各二十兩　澤蘭葉　乾薑炮　肉桂去粗皮
艾葉微炒　黃芪去蘆　牡丹皮各二斤半　肉蓯蓉酒浸焙
厚朴去粗皮薑汁炙令熱各五斤

右爲細末以前安息香膏入白麵同煮作糊和圓如梧桐子大每服三十圓食前以溫酒下醋湯亦得

【吳茱萸湯】治婦人藏氣本虛宿挾風冷胸膈滿痛腹脇疼刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄痢不止少氣羸困及因而生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉甚並皆治之

桔梗去苗半兩　吳茱萸湯洗七遍微炒二兩　熟乾地黃三分
防風去苗叉　乾薑炮　甘草炙　當歸去苗微炒
細辛去苗各半兩

右爲粗散每服三錢水一盞煎至八分細濾去滓熱服空心食前

【溫經湯】治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及少腹有寒久不受胎

阿膠蛤粉碎炒　當歸去蘆　芎藭　人參

肉桂去粗皮。　甘草炒。　芍藥　牡丹皮各二兩。
半夏湯洗七次二兩半。　吳茱萸湯洗七次焙炒三兩。
麥門冬去心五兩半。

右爲粗末每服三錢水一盞半入生薑五片煎至八分去滓熱服空心食前服。

【禹餘糧圓】治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食。

桑寄生　柏葉微炒。　厚朴去粗皮塗薑汁炙。
當歸去蘆微炒。　附子炮去皮臍。　鼈甲醋浸去裙炙黃。　乾薑炮。
白芍各一兩。　禹餘糧燒醋淬七遍飛研。　白石脂各二兩。
狗脊去毛。　白芍藥各三分。　吳茱萸湯洗七次微炒半兩。

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或米飲下空心食前服。

【逍遙散】治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮衞不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸。

甘草微炙赤半兩。　當歸去苗剉微炒。　茯苓去皮白者。　白芍藥
白朮　柴胡去苗各一兩。

右爲粗末。每服二錢。水一大盞。燒生薑一塊。切破。薄荷少許。同煎至七分。去滓。熱服。不拘時候。

【白薇圓】調補衝任。溫暖子宮。治胞絡傷損。宿受風寒。久無子息。或受胎不牢。多致損墮。久服去下臟風冷。令人有子。

秦椒去目及閉口者。微炒出汗。　白薇去苗。　熟乾地黃
當歸去蘆。剉。微炒。　薑黃各一兩七錢半。　蕖本去苗及土。　牡蒙各一兩二錢半。
禹餘糧火煅。醋淬七遍。研二兩。　人參　柏子仁微炒。
桑寄生　附子炮。去皮臍。　肉桂去粗皮。　五味子去梗。
吳茱萸湯浸微炒。　石斛去梗。　牛膝去苗。酒浸一宿。焙乾。
甘草炙微赤。　防風去苗。　菅蒻各一兩半。

右爲細末。入研藥勻。煉蜜圓如梧桐子大。每服三十圓至五十圓。溫酒或米飲下。空心食前服。纔覺姙娠。卽住服。已懷孕者。尤不宜服之。

【膠艾湯】治勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋瀝漏下。連日不斷。臍腹疼痛。及姙娠將攝失宜。胎動不安。腹痛下墜。或勞傷胞絡。胞阻漏血。腰痛悶亂。或因損動胎上搶心。奔衝短氣。及因產乳。衝任氣虛。不能約制。經血淋瀝不斷。延引日月。漸成羸瘦。

阿膠碎炒燥。　芎藭　甘草炙。各二兩。　當歸

艾葉微炒各三兩　白芍藥　熟乾地黃各四兩

右爲粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分濾去滓稍熱服空心食前日三服甚者日併服

【保生圓】衞胎益血安和子臟治妊娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上攻暈悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疼痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成虛勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷

大麻仁去殼一兩半　貝母　黃芩

大豆黃卷　粳米　甘草微炙赤

肉桂去粗皮　石斛去根　石膏細研各一兩　乾薑炮　當歸去蘆炒半兩

秦椒微炒出汗一兩

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓嚥用溫酒或棗湯化下嚼亦得空心食前服

【半夏茯苓湯】治妊娠惡阻心中憤悶頭目眩暈四肢怠惰百節煩疼胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好噉鹹酸多臥少起全不進食

旋覆花　陳皮去穰，麩炒。　桔梗　白芍藥
人參　甘草微炙赤。　芎藭各半兩。　赤茯苓
熟乾地黃酒浸，各三分。　半夏湯洗十遍，切焙，一兩一分。

右爲粗末，每服二錢，水一盞半，生薑四片，同煎至八分，去滓，稍熱服，食前服，次服茯苓圓三十，卽撰水消除，便能食。

【茯苓圓】治妊娠阻病，心中煩憒，頭目眩重，憎聞食氣，嘔逆吐悶，顚倒不安，四肢困弱，不自勝持，常服此藥，消痰水，令能食，强力，養胎，當先服半夏茯苓湯，次進此藥。

葛根　枳實去穰，麩炒黃。　白朮　甘草炙，各二兩。
赤茯苓去皮。　人參　乾薑炮。　肉桂去粗皮。
陳皮　半夏湯洗七遍，去骨切焙，各一兩。

右爲細末，煉蜜和爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，溫米飲空心下，食前服。

【催生丹】治產婦生理不順，產育艱難，或橫或逆，並宜服之，神效。

麝香別研，一處。　乳香別研極細，一分。　母丁香取末，一錢。　兔腦髓臘月者，去皮膜研。

右拌勻，以兔腦和圓，如鷄頭穰大，陰乾，用油紙密封貼，每服一圓，溫水下，卽時產下，隨男左女右手中握藥圓出是驗。

紹興續添方

【黑神散】治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿或臍腹堅脹撮疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

黑豆炒半升去皮　熟乾地黃酒浸　當歸去蘆酒製　肉桂去粗皮
乾薑炮　甘草炙　芎藥　蒲黃各四兩

右爲細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎調下急患不拘時候連進二服

【油煎散】治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦喘滿虛煩噦噦少氣發熱汗多口乾舌澁不思飲食

五加皮　牡丹皮　赤芍藥　當歸去蘆各一兩

右爲末每服一錢水一盞將青銅錢一文醋油入藥煎七分溫服煎不得攪吃不得吹日三服常服能肥婦人其効妙甚

【安胎飲】治妊娠三月四月至九箇月惡阻病者心中憒悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

熟乾地黃洗酒洒蒸焙　地榆　甘草微炙赤
茯苓去皮　白芍藥　當歸去蘆洗酒浸　川芎

白朮　半夏湯洗七次。　阿膠搗碎。炙炒。　黃芪去苗。各等分。

右爲粗散。每服三錢。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。不拘時。如或惡食。但以所思之物任意與之必愈。按姙娠禁忌。勿食鷄鴨子。鯉魚。膾兎。犬。驢。騾。山羊肉。魚子。鱉卵。雉。雀。桑椹。又按胎教論云。令母常居靜室。多聽美言。聽人講論詩書。陳說禮樂。耳不聽非言。目不視惡事。心不起邪念。能令生子龐厚福壽。忠孝仁義聰明無疾。斯乃聖人所留教論。故隨方狀以書。

淳祐新添方

【琥珀黑龍丹】治產後一切血疾。淋露不快。兒枕不散。積瘕堅聚。按之攩手疼痛攻心。困頓垂死者。但灌藥無有不效。

五靈脂去沙石。　當歸去蘆。　川芎　乾地黃生者。

良薑

已上各等分。入沙合內。赤石脂泥縫紙筋。和鹽泥固濟封合。炭火十觔。煆通紅。去火候沙合冷。開取合子。看成黑糟。乃取出。細研入後藥。〇一本云。用橡頭沙合。

花乳石煆。　琥珀研。各一錢。　乳香別研。　硫黃研。各一錢半。

百草霜別研。五兩。

右同爲細末。米醋煮糊圓。如彈子大。每服一圓。炭火燒通紅。投生薑自然汁與無灰酒各一合。小便

牛盡研開頓服立効。

吳直閣增諸家名方

【南嶽魏夫人濟陰丹】治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癖瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣治產後百病百日內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾。

秦艽　石斛去根酒浸焙　藁本去蘆　甘草炙

蠶布燒灰　桔梗炒各二兩　京墨煆醋淬研　茯苓去皮各一兩

人參去蘆二兩　木香炮一兩　桃仁去皮尖炒一兩　香附炒去毛

澤蘭去梗各四兩　當歸去蘆

熟乾地黃洗過酒蒸焙　乾薑炮　細辛去苗　川芎

肉桂去粗皮　川椒去目炒各三分　蒼朮泔浸去皮八兩

牡丹皮各一兩半　山藥

糯米炒一升○一本云山藥川椒各三兩。

右爲細末煉蜜溲每兩作六圓每服一圓細嚼空心食前溫酒醋湯任下。

續添諸局經驗祕方

【琥珀圓】治婦人或老或少產前產後百病及瘵三十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痹等手足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出幷衣不下並宜服之

琥珀研　辰砂別研　沉香　阿膠碎炒

肉桂去麤皮　石斛去根　附子炮去皮臍　五味子揀淨

川芎各半兩　牛膝去苗酒浸一宿　當歸去苗炒　人參

肉蓯蓉切酒浸一宿焙　續斷　沒藥研各三分

熟乾地黃　木香各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓空心暖酒調下午晚食前再服能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒服諸痢及赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服洩瀉不止陳米飲服澀尿諸淋煎通草燈心湯服血暈不知人煎當歸酒調服上焦下冷濃煎人參湯服偏身虛腫水氣煎赤小豆湯服產內二毒傷寒及中風角弓反張身如板硬煎麻黃湯服使被蓋出汗月經不通或間雜五色頻併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦午寒午熱四肢煩疼五心燥熱黑黯偏身血斑赤腫走注及血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便爲妙若恐惡心和以牛酒如懷胎人於難月一日一服至產下不覺疼痛或病人服至五服十服日倍飲食是藥功成矣其

功不能具載，略述急用湯使於前。

【白堊丹】治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，抑急短氣，心脇腰背腹肚與子臟相引痛，漏下五色，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，皆是內傷所致，並皆治之。

牡蠣煅研。　白堊　烏賊魚骨燒灰。　白石脂煅。　龍骨煅研各一兩半。

細辛去苗。　附子炮，去皮臍。　芎藭　石韋去毛。

瞿麥穗　黃連去鬚。　茯苓去皮。　肉桂去粗皮。

白斂　當歸去苗。　乾薑炮。　人參

白芷　川椒去目及閉口者，炒出汗，半兩。

甘草炙，各一兩。

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心溫酒下。

【人參養血圓】治女人稟受怯弱，血氣虛損，常服補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒痹，緩中下堅脹，安神潤顏色，通氣散悶，兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾不食，崩傷眩暈，及產出月羸瘦不復常者。

烏梅肉三兩。　熟乾地黃五兩。　當歸去苗，二兩。　人參

川芎　赤芍藥　菖蒲微炒，各一兩。

右為細末，蜜溲杵數千下，圓如梧桐子大，每服五十圓至百圓，溫酒米湯下，食前服。

【牡丹散】治血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪頰赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜臥。及血熱相搏。月水不利。臍腹脹痛。寒熱如瘧。又治室女血弱陰虛。榮衛不和。痰嗽潮熱。肌體羸瘦。漸成骨蒸。

乾漆二兩。炒。　蓬莪朮炮。　蘇木　鬼箭各一分。
甘草半鹽湯炙半生。　當歸　桂心　牡丹皮
芍藥　陳皮去白。　紅花　延胡索炒。
沒藥別研令細。　烏藥各一兩。

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。不拘時服。

【調中湯】治產後腸胃虛怯。寒邪所侵。及未滿月飲冷當風。乘虛襲留於肓膜。散於腹脇。腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞瀉腸鳴。或下赤白。胠脇脹痛。或走痛不定。急宜服之。

當歸　肉桂去粗皮。　白芍藥
附子炮。　良薑各一兩。　甘草炙半兩。

右爲剉散。每服三錢匕。水三盞。煎至一盞。去滓熱服。

【旋覆湯】治產後傷風。感寒暑濕。咳嗽喘滿。痰延壅塞。坐臥不寧。

旋覆花　前胡　麻黃去節。
赤芍藥　五味子　杏仁去皮尖。麩炒。
半夏麴　茯苓去皮。

甘草炙。　荆芥去梗。

右各等分爲粗末。每服四大錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎至七分。去滓。食前服。

【黑龍丹】治證品味。與前琥珀黑龍丹同。

【當歸養血圓】治產後惡血不散。發歇疼痛。及惡露不快。臍腹堅脹。兼室女經候不勻。赤白帶下。心腹腰脚疼痛。

當歸　延胡索炒。　赤芍藥　丹皮各二兩。

肉桂一兩。

右爲細末。蜜圓如梧桐子大。溫酒米飲下三十圓。食前溫服。痛甚。細嚼嚥下。

【阿膠枳殼圓】治產後虛羸。大便秘澁。

阿膠碎炒。　枳殼浸去穰。麩炒。各二兩。　滑石研飛爲衣。半兩。

右爲末。煉蜜圓如梧桐子大。每服二十圓。溫水下。半日來未通。再服。

【失笑散】治產後心腹痛欲死。百藥不效。服此頓愈。

蒲黃炒香。　五靈脂酒研淘去沙土。各等分爲末。

右先用醯醋調二錢。熬成膏。入水一盞。煎七分。食前服。熱服。

【增損四物湯】易簡方。治婦人氣血不足。四肢惰怠。乏力少氣。兼治產後下血過多。榮衞虛損。陰陽不和。

乍寒乍熱。並皆服之。

當歸　川芎　人參　乾薑炮。

甘草炙。　白芍藥各等分。

右㕮咀。每服四錢。水一盞。煎至六分。去滓。熱服。若產後寒熱。腹中刺痛。則有敗血。當用五積散加醋煎。及大聖散服之。若所下過多。猶有刺痛。亦宜服此二藥。【一方】治經血凝滯。腹內血氣作疼。用四物湯加羌活。官桂等分。名六合湯。【一方】治下血不止。及妊娠胎動。加熱艾。乾薑。甘草。阿膠。黃芪。等分。名膠艾湯。【一法】治血痢止。加膠艾。治產後血搏。口乾煩渴。加栝蔞。麥門冬。煩熱。小便澁。大便閉。加大黃。桃仁湯。脇膜。加厚朴。枳實。虛煩不得睡。加竹葉人參。大渴煩燥。加知母石膏。【一方】治婦人血虛心腹疼痛不可忍者。去地黃。加乾薑名四神湯。大率產後。不問下血多少。須日進黑神散三服。

【附產前將護法】按諸家產論云。凡產婦入月。切忌飲酒。恐產時心神昏亂。臨產之時。不可令傍人喧擾。大小愴忙。慮致驚動產母。秪可令熟事產婆。及穩審謹卓老成親密三兩人扶侍。產母初覺腹痛。且宜任意坐臥。勉強飲食。恐致臨產氣力虛羸。若腹痛漸甚。唯宜熟忍。仍可按節次漸服。滑胎。榆白皮散一二服。服藥之法。慎勿太早。須得其時。又傍人不得逼迫。且須令人扶策。徐徐而行。若行步稍難。即凭物而立。須臾扶策再行。直至腹痛連腰相引作陣痛頻。即服催生丹一服。更且勉強扶行。陣痛轉甚。難以立忍。是產時將至。即服催生符畢。後然安詳上草。上草之時。慎勿傷早。若太早。則子在腹中難以轉

側。又須仔細體候。直待兒過欲生。然後令抱腰也。抱腰之人。不得傾斜。則兒得順其理自然易產也。又有臥產者。亦待臥定背平着蓆體不偏曲則子不失其道。苟或不能依此節適。必致產難。縱或幸免。必須變生諸疾。

【產後將護法】按經云。婦人非止臨產須憂。至於產後。大須將理。愼勿以產時無他。乃縱心恣意無所不犯。犯時微若秋毫。感病重於嵩岱。且纔得分娩。切忌問是男是女。看血下多少。隨證服壓血暈藥。良久。吃粥。服四順理中圓。便令人從心下按至臍腹。日五七次。若有疾證。卽隨證服藥。粥藥相間。頻頻服餌。且宜閉目而坐。背後倚物。左右看承。常令直立兩膝。雖時眠睡。頻令換覺。過一復時。方得上床。亦須立膝高檛。床頭厚鋪稠褥。遮圍四向。窒塞孔隙。恐禦賊風。一臘之內。常聞醋煙以防暈悶。一臘之後。漸加滋味。或以羊肉雌雞煮濃汁作糜粥。宜至百日。常服當歸圓一兩服。以養藏氣。補血脈。滿月之內。尤忌任意飲食。觸冒風寒。恣情喜怒。梳頭用力。高聲作勞工巧之類。及上廁便溺。如此節養將攝。以至百日。始得氣血和調。腑臟平復。設此不依。卽致產後餘疾。

【胎神遊方】

正二三四五六七八九十十一十三

床戶門灶自身灶子方廁門戶灶床

所直方位忌修造主損胎。

【催生符】



右件符．用水飛硃砂書之．貼於房內北壁上．遇坐草之時．劖於針上．就燈燒之．不得飛揚．溫水調服．